

Kemoterapi med Taxol og Xeloda®

Du skal i behandling med Taxol og Xeloda®, som begge er kemoterapi.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Taxol

Taxol er et celledræbende stof, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst. Taxol er et stof, der stammer fra barken på takstræ. Det er et plantestof, som kan give allergiske reaktioner. Taxol gives i en blodåre i et drop.

Xeloda®

Xeloda® er et celledræbende stof, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst. Xeloda® er tabletter.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger (21 dage). Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- På den 1. behandlingsdag får du både Taxol og Xeloda®.
- I uge 1 og 2 skal du dagligt tage Xeloda®-tabletter morgen og aften med 12 timers interval.
- I uge 3 holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have. Efter hver 3. serie skal du CT-skannes, så vi kan vurdere effekten af behandlingen.

På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Din vægt registreres.

- Du får Taxol i en blodåre i et drop over cirka 3 timer.
- Samme aften skal du tage de første Xeloda®-tabletter, som du skal tage 2 gange dagligt i 14 dage. Du skal synke tabletterne hele i forbindelse med et måltid eller senest 30 minutter efter et måltid.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

Tag ikke dobbeltdosis, hvis du glemmer en dosis

Glemmer du at tage en dosis, eller kaster du op umiddelbart efter, at du har taget tabletterne, skal du ikke tage en ny dosis eller tage dobbeltdosis næste gang. Fortsæt i stedet planmæssigt med behandlingen. Kommer du til at tage mere end den ordinerede dosis, skal du kontakte os.

Opbevar medicinen således

Du skal opbevare Xeloda®-tabletterne ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Medbring eventuel overskydende medicin, næste gang du kommer på hospitalet.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Vigtigt: Husk at tage den forebyggende medicin

Dagen før behandlingen og på behandlingsdagen er det vigtigt, at du tager den forebyggende medicin mod allergisk reaktion og kvalme, som du har fået udleveret. Det er vigtigt, at du husker dette.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Føleforstyrrelser i hænder og fødder**
- **Diarré og forstoppelse.** Du kan få diarré. Du må maksimalt have 4 vandtynde afføringer per dag. Du kan afhjælpe diarré ved at tage 2 tabletter loperamid ved første diarré, herefter 1 tablet ved hver diarré. Du må maksimalt tage 8 tabletter i døgnet. Hvis der går mere end 24 timer, inden diarréen stopper, skal du kontakte os. Husk at drikke rigeligt med væske, det vil sige cirka 2 liter i døgnet.
- **Allergisk reaktion.** Du får forebyggende medicin for at undgå en allergisk reaktion.
- **Led- og muskelsmerter.** Du kan afhjælpe smerterne med smertestillende håndkøbsmedicin.
- **Irriteret slimhinde i munden.** Slimhinden i munden kan blive rød og irriteret. Du kan forebygge irritation ved at børste tænder jævnlige, og du kan lindre generne ved at skylle munden i kamillete.
- **Irritation af øjne.** Slimhinderne i øjnene kan blive irriterede, og du kan opleve, at øjnene løber i vand. Du kan eventuelt afhjælpe generne med kunstig tårevæske, som vi kan give dig ved behov.
- **Irritation af huden.** Huden kan blive rød, tør og sviende, særligt i håndflader og på fodsåler. Du kan til en vis grad forebygge generne ved at smøre huden med en fed creme allerede fra begyndelsen af behandlingen.
- **Smerter i brystkassen.** Medicin kan i sjældne tilfælde give blodprop i hjertet. Hvis du får stærke

smerter midt i brystet, der stråler ud til armen og/eller kæben, skal du straks ringe 1-1-2.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover (målt i endetarm eller øre)
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine
- Diarré, som ikke stopper, selvom du har taget stoppende medicin og fulgt den vejledning, vi har givet dig.
- Brystsmerter eller trykken for brystet.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00