

Sådan bruger du Betnovat-creme under strålebehandling

Betnovat er et stærktvirkende steroid-præparat, som hæmmer irritation i huden og dæmper den rødme, der kan opstå i huden efter strålebehandling. Cremen virker desuden kløestillende.

Sådan bruger du cremen

Følg denne fremgangsmåde, når du skal bruge Betnovat-creme:

- Smør cremen på den irriterede hud i et tyndt lag 1 gang dagligt.
- Du opnår ikke større effekt ved at påføre et tykt lag eller ved at smøre flere gange dagligt.
- Følg denne "pegefingerregel" for at opnå korrekt dosering.
-



1 fingerspids (det yderste led af pegefingeren) svarer til et hudområde på størrelse med 2 håndflader

- Cirka 10 minutter efter, du har smurt med Betnovat-creme, kan du smøre med en uparfumeret fugtighedscreme.
- Du må dog ikke anvende creme i 2 timer før strålebehandling.
- For at beskytte dine hænder bør du bruge handsker, når du påfører Betnovat-creme, eller vaske dine hænder efter brug af cremen.

Bivirkninger ved brug af betnovat

Bivirkninger opstår ved forkert brug og lang tids vedvarende behandling med Betnovat-creme. Du må anvende cremen i højst 6 uger. Ved lang tids brug kan huden blive tynd, og der kan opstå fremtrædende kar, små blødninger i huden samt mindre bumser. Du skal altid fortælle personalet om eventuelle bivirkninger.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Stråleterapien

Tlf. 97 66 15 41

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 15.00