

Sådan bruger du Locoid-creme 0,1% under strålebehandling

Locoid-creme er et middelstærkt steroid-præparat, som hæmmer irritation i huden og dæmper den rødme, der kan opstå i huden. Cremen virker desuden kløestillende.

Sådan bruger du Locoid-creme

- Smør cremen på den irriterede hud i et tyndt lag 1-2 gange dagligt.
- Du opnår ikke større effekt ved at påføre et tykt lag eller ved at smøre flere gange dagligt.
- Følg denne "pegefingerregel" for at opnå korrekt dosering. Cirka 10 minutter efter, at du har smurt med Locoid-creme 0,1 %, kan du smøre med en uparfumeret fugtighedscreme.



1 fingerspids (det yderste led af pegefingeren) svarer til et hudområde på størrelse med 2 håndflader

- Du må dog ikke anvende creme i 2 timer før strålebehandling.
- For at beskytte dine hænder bør du bruge handsker, når du påfører Locoid-creme 0,1 %, eller vaske dine hænder efter brug af cremen.

Bivirkninger ved brug af Locoid-creme 0,1%

Bivirkninger opstår ved forkert brug og lang tids vedvarende behandling med Locoid-creme 0,1%. Derfor må du anvende cremen i højst 6 uger. Ved lang tids brug kan huden blive tynd, og der kan opstå fremtrædende kar, små blødninger i huden samt mindre bumser. Du skal altid fortælle personalet om eventuelle bivirkninger.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Afdeling for Kræftbehandling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Find mere info: <https://aalborguh.RN.dk/kræftbeh>