



Behandling med Avastin® hver 2. uge

Du skal i behandling med Avastin®, også kaldet bevacizumab, som er et antistof.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Avastin hæmmer vækst af kræftknuden ved at blokere væksten af de blodkar, som forsyner kræftknuden med næringsstoffer og ilt.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have behandling i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 2 uger. Det foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- På den 1. behandlingsdag får du Avastin®. Behandlingen gives eventuelt sammen med andre stoffer.
- I den 2. uge holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

På behandlingsdagen

- Du bliver vejlet og får målt blodtryk.
- Du får Avastin® i et drop i en blodåre over 30 minutter i 1. behandlingsserie, og over 10 minutter i 3. behandlingsserie og de efterfølgende serier.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Bliv CT-skannet

Inden du begynder på behandlingen, skal du have foretaget en CT-skanning. Du skal skannes tidligst 4 uger før behandlingens start. Skanningen bruger vi som udgangspunkt for at evaluere, om behandlingen har effekt. Du skal have lavet en ny skanning, når du

har fået 3 behandlingsserier. Du bliver indkaldt til CT-skanningen.

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver ny behandlingsserie. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Medbring en urinprøve

Medbring en urinprøve, når du kommer til behandling. Vi undersøger urinprøven for protein.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Let hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandling
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.
- **Forhøjet blodtryk.** Nogle patienter får forhøjet blodtryk. Du skal have målt dit blodtryk før hver behandling. Hvis dit blodtryk er forhøjet, kan det være nødvendigt, at du tager blodtrykssænkende medicin.
- **Protein i urinen.** Medicinen kan medføre, at nyrerne udskiller protein. Ofte udskilles kun ganske små mængder, som ikke betyder noget. Hvis det er større mængder, skummer urinen i toiletkummen, når du lader vandet. Vi måler mængden af protein i din urin ved hver behandling.



- **Langsom sårheling.** Sår heler langsommere, når du får behandlingen. Vær derfor varsom og undgå at komme til skade.
- **Blodprop.** Der er en lille øget risiko for blodpropper. Får du en blodprop, behandler vi den med blodfortyndende medicin. Symptomer på blodpropper er hævelse og rødme af et ben eller en arm. Det kan også være smerter, eventuelt som stik i brystet, eller forpustelse. Oplever du nogle af disse symptomer, skal du straks kontakte os.
- **Hul i tarmen.** En meget sjælden bivirkning er, at der opstår hul i tarmen. Symptomer på dette er stærke smerter i maven og eventuelt feber. En hul i tarmen kræver akut behandling, og du skal derfor altid kontakte os straks, hvis du får disse symptomer.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Læge- og tandlægebesøg

Hver gang du kontakter en læge eller tandlæge, skal du gøre opmærksom på, at du er i behandling med Avastin® – også hvis du søger læge for andre problemer end din kræftsygdom.

Eventuelle operationer

Da sår heler langsommere, når du er i behandling med Avastin®, skal en eventuel større operation helst foretages tidligst 28 dage efter, at du er stoppet eller holder pause med behandlingen. Mindre indgreb skal foretages tidligst 7 dage efter.

Ved akutte, nødvendige operationer skal du oplyse, at du er i behandling med Avastin®.

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover.
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx tandkød eller endetarm
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00