



Behandling med Alecensa

Du skal i behandling med kræftmedicinen Alecensa, også kaldet Alectinib.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Alecensa virker ved at hæmme aktiviteten af et proteinet ALK, der findes på celleoverfladen i mange kræftceller. Proteinets medvirker til, at kræftcellerne kan vokse ukontrolleret og spredes. Alecensa skal modvirke denne spredning.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Alecensa er en tabletbehandling, som tages hjemme. Du skal tage tabletterne morgen og aften i forbindelse med et måltid sammen med et glas vand. Du må ikke tage tabletterne sammen med grapefrugt.

Tag ikke dobbeltdosis, hvis du glemmer en dosis

Glemmer du at tage en dosis, eller kaster du op umiddelbart efter, at du har taget tabletterne, skal du ikke tage en ny dosis eller tage dobbeltdosis næste gang. Fortsæt i stedet planmæssigt med behandlingen. Kommer du til at tage mere end den ordinerede dosis, skal du kontakte os.

Opbevar medicinen således

Du skal opbevare Alecensa-tabletterne ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Medbring eventuel overskydende medicin, næste gang du kommer på hospitalet.

SÅDAN ER FORLØBET I HOVEDTRÆK

Kontrol hos os hver 4. uge

Hver 4. uge skal du til en samtale hos os. I den forbindelse kontrollerer vi dine blodprøver, og du får udleveret Alecensa til den næste periode.

Skanning hver 12. uge

Hver 12. uge kontrollerer vi behandlingens effekt med en skanning. Du vil blive indkaldt til skanningen.

Behandlingen fortsætter, så længe sygdommen ikke udvikler sig, og så længe bivirkningerne er acceptable.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver før hver kontrol

Du skal have taget blodprøver før hver kontrol. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Få taget EKG hver 8. uge

Der skal have taget EKG i forbindelse med opstart af behandlingen og herefter hver 8. uge, det vil sige hver 2. gang du kommer til kontrol. Du kan bestille tid til EKG på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Brug MitID for at bestille. Du kan få taget EKG, når du alligevel får taget blodprøver og kan også bestille tid samtidig.

Medbring urinprøve

Der skal medbringes en urinprøve til hver behandling



BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Diarré.** Du kan få diarré. Du må maksimalt have 4 vandtynde afføringer per dag. Du kan afhjælpe diarré ved at tage 2 tabletter loperamid ved første diarré, herefter 1 tablet ved hver diarré. Du må maksimalt tage 8 tabletter i døgnet. Hvis der går mere end 24 timer, inden diarréen stopper, skal du kontakte os. Husk at drikke rigeligt med væske, det vil sige cirka 2 liter i døgnet.
- **Hududslæt.** En hyppig bivirkning er udslæt. Du kan med fordel smøre det med en fed, uparfumeret creme.
- **Synsforstyrrelser.**
- **Kvalme og eventuelt opkastning.**
- **Påvirkning af nyrefunktionen.**
- **Påvirkning af leverfunktionen.**
- **Muskelsmerter.**
- **Vægtøgning og væskeophobning.**
- **Øget følsomhed for sollys.**
- **Betændelse i slimhinden i munden.**
- **Lungeirritation (pneumonitis).** Irritation af lungerne forekommer i sjældne tilfælde og mærkes som pludselig åndenød ledsaget af hoste eller feber. Hvis du får disse symptomer, skal du ringe til os.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer:

- Diarré, som ikke stopper trods stoppende medicin
- Voldsomt udslæt
- Feber på 38,5 grader eller derover
- Forværring i åndenød
- Svimmelhed og tilfælde af besvimelse
- Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00