

Behandling med 5-fluorouracil og oxaliplatin

Du skal i behandling med 5-fluorouracil (5-FU) og oxaliplatin. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

tages af på 3. dag, enten af en hjemmesygeplejerske eller på hospitalet.

- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Den behandling, vi vil tilbyde dig, består af to slags kemoterapi, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst, samt calciumfolinat, som er en form for B-vitamin, der forstærker virkningen af kemostoffet (5-FU).

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have behandling i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 2 uger. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- Du får behandling på dag 1, 2 og 3 i hver behandlingsserie. Dag 2 og 3 foregår derhjemme.
- Du holder pause med behandlingen resten af uge 1 og hele uge 2.
- Nederst kan du se et skema over behandlingerne.

Efter hver 4. behandling evaluerer vi effekten af behandlingen med en skanning. Behandlingen vil fortsætte, så længe der er tilstrækkelig kontrol med kræftsygdommen. Behandlingen kan pauseres eller stoppes før tid, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe.

Hver behandling foregår således:

- Du får calciumfolinat samtidig med oxaliplatin i et drop over cirka 2 timer.
- Efterfølgende får du 5-FU i et drop over 3-5 minutter.
- Du får herefter tilkoblet en pumpe med 5-FU, som frigiver kemoterapien over 46 timer. Pumpen

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver ny behandlingsserie. Blodprøverne skal tages på et hospital inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling. Bestil tid til blodprøven på <https://booking.rn.dk>. Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Udfyld Ambuflex

Svar på spørgsmålene i Ambuflex 2 hverdage før behandling. Har du en tid til behandling om mandagen, skal du svare senest fredag morgen inden kl. 9.00.

BIVIRKNINGER

Medicinsk kræftbehandling påvirker ikke alene kræftceller, men også kroppens raske celler. Det betyder, at du kan få bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men vi kan dog heller ikke på forhånd udelukke, at der kommer andre bivirkninger end dem, der er nævnt her.

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed.**
- **Påvirkning af knoglemarven.** Kemoterapien påvirker din knoglemarv, så blandt andet dit immunforsvar (de hvide blodlegemer) kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver inden hver behandling. Oplever du feber over

38,5 °C, skal du straks tage kontakt til Onkologisk Afdeling.

- **Kvalme og opkastninger.** Kvalme og opkastninger kan forekomme. Du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Nervepåvirkning.** Sovende/summende fornemmelse i fingre og/eller tæer, særligt udløst af kulde. Ses hos næsten alle og er oftest mest udtalt i dagene efter hver behandling. Symptomerne fortager sig ofte, inden der gives behandling på ny, men der er en risiko for, at der kan udvikles permanente nerveskader. Fortæl os derfor altid, hvis du har en vedvarende summen eller sovende fornemmelse eller har påvirket finmotorik mellem hver behandling, som ikke længere udelukkende er udløst af temperaturpåvirkning (fx hvis du har problemer med at knappe knapper, holde på en blyant eller besvær med at mærke underlaget under fødderne).
Man kan desuden opleve en strammende fornemmelse i halsen, hvis man drikker noget koldt eller trækker kold luft ind. Dette kan føles meget ubehageligt, men er helt ufarligt. Dette ses oftest på selve behandlingsdagen og kan forebygges ved at have noget varmt med at drikke eller trække vejret roligt i et ærme eller lignende.
- **Irritation af huden.** Huden kan blive øm, rød, tør, revne og skalle af, særligt i håndflader og på fodsåler. Du kan til en vis grad forebygge generne ved at smøre huden med en fed creme allerede fra begyndelsen af behandlingen.
- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det. Hvis du får diarré, der ikke kan stoppes i løbet af 24 timer med den medicin, du får udleveret (loperamid), skal du straks tage kontakt til Onkologisk Afdeling.
- **Påvirkning af slimhinder i øjne og mund.** Slimhinderne i øjne og mund kan blive irriterede. Øjnene kan blive tørre og løbe i vand. Der kan komme blister og blæner i mundhulen og

eventuelt sår. En del vil opleve smagsændringer og påvirket appetit.

- **Påvirkning af hjertet.** Kemoterapien kan i sjældne tilfælde give krampes i blodkarrene i hjertet eller medføre andre påvirkninger af hjertet. Det kan opleves som brystmerter, rytmeforstyrrelser eller åndenød. Får du symptomer under behandlingen, er det vigtigt, at du informerer os.
Hvis du får stærke trykkende smerter midt i brystet, der eventuelt stråler ud til armen, ned i maven eller op i halsen, skal du straks ringe 1-1-2.

Fortæl os om bivirkningerne

Bivirkninger til behandlingen kan i sjældne tilfælde blive meget alvorlige og i værste fald være livstruende. Der findes medicin, der kan afhjælpe eller mindske generne fra flere af bivirkningerne. Derfor er det vigtigt, at du fortæller os om de bivirkninger, du har. Det kan du enten gøre via Ambuflex, når du kommer til behandling, eller ved at ringe til os.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

Hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger, skal du kontakte os straks:

- Feber over 38,5 °C
- Diarré, som ikke stopper, selvom du har taget stoppende medicin og fulgt vores vejledning
- Nervepåvirkning, der ikke svinder mellem hver behandling
- Kvalme og opkastning
- Spontane blødninger
- Brystmerter eller trykken for brystet.

Seksualitet og samvær

Sygdom og behandling berører mange sider af livet, og lysten til seksuelt samvær kan blive påvirket. Du kan føle dig træt og uoplagt og synes, at det seksuelle er sekundært i forhold til at komme igennem sygdomsforløbet og behandlingen.



Graviditet og amning

Hvis der er mulighed for, at du eller din partner kan blive gravid, skal I anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel.
Kvinder, der ammer, skal ophøre med dette for at beskytte barnet.

Øvrig medicin

Hvis du tager naturmedicin, kosttilskud eller anden medicin end den, der er ordineret af Onkologisk Afdeling, er det vigtigt, at du fortæller det. Dette skyldes, at det kan have betydning for effekten af den onkologiske behandling.
Hvis du kommer i lægebehandling uden for Onkologisk Afdeling, er det ligeledes vigtigt, at du fortæller, hvilken behandling du er i gang med på Onkologisk Afdeling.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00



SKEMA OVER BEHANDLINGEN

Skemaet viser 4 serier. De efterfølgende serier vil forløbe på samme måde.

	Serie 1				Serie 2				Serie 3				Serie 4			
	1. uge			2. uge	3. uge			4. uge	5. uge			6. uge	7. uge			8. uge
Dag	1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3	
Calciumfolinat	x				x				x				x			
Oxaliplatin	x				x				x				x			
5-FU	x				x				x				x			
5-FU i pumpe	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Pumpen fjernes			x				x				x				x	
Samtale ved læge/sygeplejer ske	x															
Blodprøver	x				x				x				x			
Skanning																x