

Behandling med Skyrizi ved hudsygdommen psoriasis

Du har fået tilbudt behandling med lægemidlet Skyrizi, der gives som en indsprøjtning under huden. Det aktive stof hedder risankizumab.

Skyrizi er et biologisk lægemiddel til behandling af psoriasis og psoriasis-gigt. Skyrizi tilbydes til voksne med moderat til svær psoriasis, hvor behandling med andre lægemidler er utilstrækkelig eller ikke tåles.

Sådan virker lægemidlet

Mennesker har et signalstof i immunforsvaret, der kaldes IL-23 og som kan være en nyttig del af immunforsvaret. Men hos personer med psoriasis findes der et overskud af IL-23 i huden, hvilket fører til mange af de symptomer, som er typiske for sygdommen.

Skyrizi er et kunstigt fremstillet antistof mod IL-23. Antistoffet binder sig til IL-23 og hæmmer effekten af det, hvorved symptomerne på psoriasis mindskes i både hud og led.

Sådan foregår den medicinske behandling

Inden behandlingen

Før behandlingen starter skal der tages et røntgenbillede af dine lunger for at undersøge for tuberkulose og andre infektioner.

Du skal også have taget blodprøver, hvor der blandt andet screenes for sygdommene HIV, leverbetændelse, tuberkulose og skoldkopper. Disse blodprøver skal tages på et hospital, og hertil skal bruges et test-kit, som du får udleveret af afdelingen.

Sådan udføres behandlingen

Ved opstart af behandlingen skal du have en indsprøjtning på første dag og efter 4 uger – svarende til behandlingsuge 0 og 4. Herefter skal du have en indsprøjtning hver 12. uge.

Indsprøjtningerne gives af en sygeplejerske i afdelingen i forbindelse med kontrol. Skulle du – fx i forbindelse med rejse – få behov for selv at skulle tage medicinen, vil du blive oplært i dette af sygeplejersken.

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme allergiske reaktioner på Skyrizi, og vi anbefaler derfor, at du opholder dig i afdelingen til observation 30 minutter efter den første behandling.

Skyrizi kan godt i særlige tilfælde anvendes samtidig med anden immundæmpende behandling, typisk Methotrexat.

Eventuel afslutning af behandlingen

Virkningen indtræder ofte i løbet af få uger, men der kan gå op til 3 måneder – nogle gange længere – inden man kan se den fulde behandlingseffekt.

Efter 16 uger vurderer vi effekten. Er der ingen effekt, standser vi behandlingen. Er der delvis effekt, kan vi vælge at fortsætte behandlingen i yderligere 3-6 måneder, og se det an. Virker behandlingen godt, kan den fortsætte i flere år.

Bivirkninger

De fleste tåler behandlingen. Der kan dog komme bivirkninger. Afdelingens personale vil fortælle dig om bivirkningerne, inden du starter behandlingen. Her er nævnt nogle af de ting, du skal være mest opmærksom på:

- Infektioner i øvre luftveje, fx ondt i halsen og forkølelse
- Svampeinfektioner, fx fodsvamp
- Reaktioner på indstiksstedet, fx smerte, hævelse, rødme og kløe
- Hovedpine
- Træthed
- Kløe.

Søg læge ved feber og tegn på infektion.

Kontrol

Du skal møde til kontrol ved sygeplejersken hver 12. uge i forbindelse med medicingivning.

Faste lægekontroller er 3-4 måneder efter opstart af behandlingen og herefter minimum en gang om året. I forbindelse med lægekontrollerne skal der tages blodprøve 1 uge forinden.

Husk at få taget blodprøver

Forud for lægekontrollen efter de første 16 ugers behandling skal du huske at få taget blodprøver – og ligeledes forud for lægekontrollen efter 12 måneders behandling.

Vær opmærksom på

Undgå graviditet, mens du får Skyrizi

- Kvinder i den fertile alder skal anvende prævention for at forebygge graviditet og fortsætte med at anvende prævention i mindst 5 måneder efter den sidste Skyrizi-behandling.
- Mænd i behandling med Skyrizi kan fortsætte med behandlingen. Der er dog begrænset viden om Skyrizis indvirkning på den mandlige fertilitet.
- Skyrizi kan ikke anvendes under amning.

Kontakt afdelingen, hvis du skal opereres

Operation skal så vidt muligt times med din behandling. Mindre operationer anbefales udført i sidste halvdel af behandlingsintervallet på 12 uger.

Forud for større, planlagte operationer anbefales eventuel pause med Skyrizi på grund af risiko for infektion. Aftal derfor med hudlægen på afdelingen, hvordan pausen skal holdes. Behandlingen kan genoptages efter veloverstået operation, fx når sting er fjernet og der ikke er tegn på mangelfuld sårheling eller infektion.

Vær opmærksom ved vaccination

Levende, svækkede vacciner må ikke gives samtidig med Skyrizi. Ved behov for levende, svækket vaccine må behandling med Skyrizi først opstartes 4 uger efter sidste vaccination.

Ved behov for vaccination med levende, svækket vaccine under behandling med Skyrizi, skal der være en behandlingspause på 5 måneder før og 3 måneder efter vaccination.

Andre vacciner, fx influenza-vaccine, COVID-19-vaccine og hepatitis-vacciner, må gerne gives under behandlingen. Se gerne særskilt information om vacciner i den generelle information om biologisk behandling.

Vær opmærksom, hvis du bliver syg

Skyrizi påvirker dit immunforsvar. Derfor skal du være særligt opmærksom på dit velbefindende og på, om du fx har feber. Har du mistanke om en infektion, skal du kontakte hudafdelingen eller din praktiserende læge. Alt efter infektionens alvorlighed kan det være nødvendigt med en pause i behandlingen.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Afdeling for Hud- og Kønssygdomme

Tlf. 97 66 66 60

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 9.00