



Medicinsk behandling med rifampicin og clindamycin

Du er blevet tilbudt behandling med rifampicin og clindamycin. Begge er antibiotika, som dæmper betændelsesprocesser i kroppen. De bruges til mere udbredte former af betændelse ved hårsækkene (hidrosadenitis suppurativa, HS). Rifampicin og clindamycin vælges altid som en kombinationsbehandling.

SÅDAN TAGER DU MEDICINEN

Du skal tage kapslerne sammen med mindst 1 glas vand ½-1 time før et måltid. Tag altid medicinen nøjagtigt efter lægens anvisning.

Forvent, at behandlingen skal blive ved i cirka 3 måneder. I enkelte tilfælde kan behandlingen forlænges

Glemte dosis?

Hvis du glemmer at tage en dosis, så fortsæt med næste dosis til planlagt tid uden ændringer.

For stor dosis?

Kommer du til at tage for meget rifampicin eller clindamycin, skal du kontakte os.

Blodprøver før og under behandlingen

Du skal have taget blodprøver før behandlingen, efter 14 dage, samt hver måned, mens du er i behandling.

Vi har bestilt blodprøverne, så de kan blive taget på hospitalet eller hos din egen læge, du skal dog selv bestille tid til at få dem taget. Vil du have dem taget på et hospital i Region Nordjylland, skal du bestille tid på www.booking.rn.dk.

Hvis vi ser, at dine blodprøver påvirkes undervejs i behandlingen, kontakter vi dig.

KOMPLIKATIONER OG MULIGE BIVIRKNINGER

Bivirkninger til rifampicin

- Urin, afføring og tårevæske farves rødt. Kontaktlinser kan derfor blive misfarvede (orange-røde).

Denne bivirkning er harmløs og forsvinder igen, når behandlingen stopper. Du kan overveje ikke at bruge kontaktlinser under behandlingen, da misfarvningen af linserne vil være permanent.

Fælles bivirkninger for rifampicin og clindamycin

Medicinen tåles som regel uden problemer, men kontakt lægen, hvis du mærker følgende:

- Ingen appetit
- Kvalme
- Mavesmerter
- Opkastninger
- Diarré
- Du bliver gul i øjnene – der, hvor der plejer at være hvidt
- Andet unormalt.

VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ

- **Svangerskabsforebyggelse.** Rifampicin nedsætter virkningen af p-piller og minipiller. Du skal bruge kondom, pessar eller lignende som svangerskabsforebyggelse, mens du er i behandling med rifampicin og 4 uger efter.
- **Alkohol.** Du frarådes at indtage større mængder alkohol under behandling med rifampicin.
- **Epilepsi.** Det kan være nødvendigt at justere anti-epileptisk behandling (medicin mod kramper), når du tager rifampicin.
- **Nyrer.** Rifampicin må aldrig bruges til patienter med Addisons sygdom, meget dårligt fungerende nyrer eller porfyri.



- **Lever.** Clindamycin må ikke bruges, hvis du lider af nedsat leverfunktion, lider af sygdommen myasthenia gravis, eller hvis du tager muskelafslappende medicin.
- **Allergisk reaktion.** Rifampicin og clindamycin må aldrig bruges, hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion på rifampicin eller clindamycin.

Det er vigtigt, at du oplyser lægen om, hvad du får af anden medicin. Der kan være medicin, der ikke kan tages sammen med rifampicin eller clindamycin.

Graviditet og amning

Graviditet frarådes, mens du er i behandling, fordi der er begrænset erfaring med gravide, der tager rifampicin og clindamycin.

Rifampicin går i modermælken. Tal med din læge, hvis du ammer, mens du er i behandling.

Gem kvitteringer for tilskud til clindamycin

Der ydes normalt ikke tilskud til clindamycin. Derfor søger den behandlende læge altid enkelt-tilskud til clindamycin.

Du får svar fra Lægemiddelstyrelsen cirka 2-3 uger efter at lægen har ansøgt. Gem derfor din kvittering fra apoteket. Hvis ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen bliver godkendt, kan du gå på apoteket og få udbetalt tilskuddet.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Afdeling for Hud- og Kønssygdomme
Tlf. 97 66 66 60
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 9.00