



Undersøgelse af binyrebarkhormon (dexamethason-suppressionstest)

Du skal have foretaget en såkaldt dexamethason-suppressionstest. Undersøgelsen kan vise, om du har tegn på øget dannelse af binyrebarkhormon.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Tag 2 tabletter aftenen inden undersøgelse

Vi har vedlagt en kuvert, som indeholder 2 tabletter Dexamethason a 500 mikrogram. Tag dem sammen med et glas vand klokken 23.00 aftenen inden undersøgelsen.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Blodprøve på hospitalet

Næste morgen skal du have taget en blodprøve. Det foregår på nærmeste hospital. Henvend dig på hospitalslaboratoriet eller blodprøvetagningen på hospitalet mellem klokken 8.00 og 9.00. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid til blodprøvetagning.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Svaret på undersøgelsen er klar efter cirka 2 uger, og du får direkte besked om resultatet.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Medicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 65 25 27

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.30