

Sådan bruger du inhalator med Seretide®

Du skal behandles med medicinen Seretide®, som bruges til at behandle kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL). Seretide® er en inhalationsmedicin, som du skal tage 2 gange i døgnet. Medicinen bruges til langtidsbehandling og er ikke beregnet til akutte tilfælde af åndenød.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Seretide® er en kombinationsbehandling. Det betyder, at den både modvirker irritation og hjælper til at udvide luftvejene.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Følg vejledningen

Seretide® skal inhaleres gennem en inhalator, som kaldes en diskus. Følg denne vejledning, når du skal tage medicinen.



Åbn diskus ved at skubbe fingregrebet helt i bund, indtil det siger klik.



Skub dosisknappen helt i bund og lad den blive der, indtil det siger klik. Nu er dosis klar.



Pust helt ud ved siden af diskus, sæt mundstykket til munden og sug ind så hurtigt som muligt. Hold vejret nogle få sekunder efterfølgende, så du ikke blæser medicinen op med det samme.



Luk diskus efter brug ved at skubbe fingergrebet tilbage, indtil det siger klik.

BIVIRKNINGER

Svamp i munden

Du kan forebygge svamp i munden ved at skylle munden grundigt eller børste tænder, efter du har taget medicinen.

Hæshed

Du kan afhjælpe hæshed ved at spise, når du har brugt inhalatoren.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Rengør inhalatoren med en opvredet ren klud. Udskift den, når den er løbet tør for medicin.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Medicinsk Afdeling, Hobro Afsnit M2

Tlf. 97 65 24 40

Vi træffes bedst:

Alle dage 9.00 – 9.30, 12.30 – 13.00
og efter 18.30