



Knoglemarvsundersøgelse

Du skal have foretaget en knoglemarvsundersøgelse, der udføres ved mistanke om sygdom i knoglemarven og/eller i blodet. Desuden kan undersøgelsen udføres for at få en status på sygdommen under og efter et behandlingsforløb.

Knoglemarven er det sted, hvor blodcellerne (hvide blodlegemer, røde blodlegemer og blodplader) dannes. Knoglemarven findes blandt andet i "hulrum" i brystbenet og hoftekammen.

Ved en knoglemarvsundersøgelse tages der en prøve af væv fra 3 forskellige steder:

- Et lille stykke knogle fra hoftekammen
- Knoglemarv fra hoftekammen
- Blod fra øret.

Undersøgelsen kan foretages, uden at du skal indlægges. Du kan altså tage hjem samme dag.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Knoglemarvsundersøgelsen udføres i Medicinsk Dagafsnit af en læge og en sygeplejerske.

Bedøvelse

Under undersøgelsen er du lokalbedøvet.

Lokalbedøvelse vil sige, at du får lagt bedøvelsen med indsprøjtning ved undersøgelsesstedet. Dermed er kun undersøgelsesstedet bedøvet, mens du er vågen. Du vil ikke føle smerte, men kan mærke berøring.

Selv undersøgelsen

Vi tager primært knoglemarvsprøven i hoftekammen, og du ligger på siden med ryggen til lægen.

Mens lokalbedøvelsen får tid til at virke, tager vi en blodprøve fra øret. Øreblodprøven tages for at sammenligne det blod, der cirkulerer rundt i kroppen med blodet, der er under dannelse i knoglemarven.

Herefter udtages knoglemarven og bagefter en prøve af knoglen. Dette gøres med en speciel kanyle. Når knoglemarven suges ud, oplever nogle en ubehagelig fornemmelse ned i benet, hvilket skyldes et undertryk i knoglen. Dette varer få sekunder.

Når alle prøver er udtaget, fjernes kanylen, og der sættes plaster på.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Kontakt os, hvis du er i blodfortyndende behandling

Er du i blodfortyndende behandling, skal du kontakte afsnittet i god tid inden undersøgelsen.

EFTER UNDERSØGELSEN

- Bedøvelsen fortager sig efter 3-4 timer.
- Der er sjældent blødning efter undersøgelsen. Du må fjerne plastret næste dag.
- Du må frit bevæge dig rundt efter undersøgelsen.
- Der kan opstå ømhed/lette smerter efter undersøgelsen. Dette kan afhjælpes med smertestillende medicin i form af paracetamol 1 gram, (fx 2 stk Panodil® eller Pamol® 500 mg) højst 4 gange dagligt.

Du får svar efter 14 dage

Det varer op til 14 dage, før der er svar på undersøgelsen. Du får et brev, når svaret foreligger.



KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Medicinsk Dagafsnit, Farsø
Tlf. 97 65 31 10
Mandag - fredag 8.00 – 15.00