

## Sådan bruger du Bricanyl i turbuhaler

Du skal behandles med Bricanyl i turbuhaler. Bricanyl bruges til akut behandling af anfald af kronisk obstruktiv lungelidelse og kan bruges, når du har behov for det.

### SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Bricanyl virker afslappende på musklerne omkring luftvejene, så bronkierne udvides, og din åndenød mindskes.


### SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Bricanyl er et pulver, som du inhalerer gennem en særlig inhalator – en turbuhaler.


#### Sådan gør du




*Skrub beskyttelseshætten af.*



*Hold turbuhaleren lodret, mens du drejer bundstykket 1 gang frem og tilbage, til der lyder et klik. Der udløses kun 1 dosis, selvom der lyder flere klik.*



*Tøm lungerne for luft. Pust ikke i turbuhaleren. Anbring mundstykket mellem tænderne og slut læberne tæt omkring. Tag en kraftig og hurtig indånding og hold vejret nogle få sekunder. Skru beskyttelseslåget på igen.*



*Når der er 20 doser tilbage, kommer en lille rød markering frem i toppen af det lille vindue. Når den røde markering når bunden af vinduet, er turbuhaleren tom.*

## BIVIRKNINGER

### Hjertebanken og rysten på hænderne

Ved hyppig brug af Bricanyl kan du opleve hjertebanken, og at du begynder at ryste på hænderne. Det forsvinder igen, når du nedsætter forbruget.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Rengør inhalatoren med en tør, ren klud cirka 1 gang ugentligt. Der må ikke komme fugt ned til medicinen.
- Husk at sætte beskyttelseshætten på efter brug.
- Udskift inhalatoren, når den er løbet tør for medicin.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

**Medicinsk Dagafsnit, Farsø**

Tlf. 97 65 31 10

Mandag – fredag 8.00 – 15.00