

# Undersøgelse for astma med Mannitoltest

Du skal have lavet en såkaldt Mannitoltest, som skal vise, om dine luftrør er særligt følsomme, og om du dermed har astma.

Mannitol er et sukkerstof, der virker ved at udtrørre slimhinderne i luftrørene. Hvis du har astma, udløser denne udtrørring en forsnævring af dine luftrør.

## SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du skal indånde små doser Mannitol i stigende doser via en inhalator. Efter hver inhalation måler vi din lungefunktion.

Mannitol virker ved at udtrørre slimhinderne i dine luftveje. Hvis du har astma, kan det medføre, at din evne til at puste ud falder. Du kan da få symptomer som ved et let astmaanfall. Hvis det sker, stopper vi testen, og du vil enten få astmamedicin eller skulle vente i ambulatoriet, indtil irritationen forsvinder.

Efter undersøgelsen taler du med en læge, som giver dig svar på undersøgelsen.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Undlad at ryge

Du må ikke ryge 8 timer før undersøgelsen.

### Undgå større fysisk anstrengelse

Du skal undgå større fysisk anstrengelse på undersøgelsesdagen.

### Undgå visse typer medicin

Visse typer medicin påvirker undersøgelsens resultat og kan medføre, at undersøgelsen bliver aflyst. Du skal du holde pause med følgende medicin, medmindre du har fået anden besked fra os:

#### 6 uger før undersøgelsen

Inhalationsmedicin med binyrebarkhormon som fx Aflusal®, Aerobec®, Alvesco®, Beclomet®, Bufomix®, Duoresp®, Flixotide®, Flutiform®, Giona®, Innovair®, Pulmicort®, Relvar®, Seretide®, Symbicort®.

#### 3 døgn før undersøgelsen

Høfebertabletter i form af antihistamin som fx Telfast®, Zyrtec®, Benadryl®, Xyzal® og Aerius®.

#### 2 døgn før undersøgelsen

Langtidsvirkende inhalationsmedicin som Anoro®, Duoklir®, Eklira®, Foradil®, Formo®, Incruse®, Onbrez®, Oxis®, Seebri®, Serevent®, Spiolto®, Spiriva®, Striverdi®, Ultibro®.

#### 24 timer før undersøgelsen

Tabletter mod astma som fx Singulair®, Montelukast, BricanylRetard®, Volmax®, Bambec®, Uno-Lin®, Nuelin®.

#### 8 timer før undersøgelsen

Korttidsvirkende inhalationmedicin som fx Airomir®, Beroudual®, Bricanyl®, Buventol®, Salamol®, Ventoline®.

Hvis du tager anden medicin for lungerne eller hvis du får binyrebarkhormon (Prednisolon), skal du ringe til os, når du får indkaldelsen til undersøgelsen, så vi kan vurdere, om du skal holde pause med medicinen før undersøgelsen. Du er også velkommen til at ringe, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal tage din

### **Undgå koffein og chokolade**

Du må ikke drikke kaffe, te og cola (koffein) eller spise chokolade på undersøgelsesdagen, da det kan påvirke undersøgelsens resultat.

### **Kontakt os, hvis du har haft infektion i luftvejene**

Hvis du har haft infektion i luftvejene inden for de seneste 2 uger før undersøgelsen, skal du kontakte os, da undersøgelsen i så fald må udsættes. Du skal derfor kontakte os, hvis du bliver forkølet, får influenza eller en anden luftvejsinfektion.

## **EFTER UNDERSØGELSEN**

Der er ingen bivirkninger eller særlige forholdsregler efter undersøgelsen.

## **SVAR PÅ UNDERSØGELSEN**

Hvis det er vores ambulatorium, der har bestilt undersøgelsen, får du svar enten ved lægekonsultationen eller per brev.

Hvis undersøgelsen er bestilt af en anden afdeling eller et andet hospital, får du svar derfra.

## **KONTAKT OG MERE VIDEN**

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### **Kontakt**

#### **Medicinsk Dagafsnit, Farsø**

Tlf. 97 65 31 10

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00