



Sådan indsprøjter du Gammanorm®

Du skal i gang med at give dig selv indsprøjtninger med Gammanorm®. I denne pjece finder du en vejledning til, hvordan du gør.

SÅDAN GØR DU

Vask og sprit hænder

Husk altid at vaske og spritte hænder, før du går i gang.

Gør remedierne klar

Find alle remedier frem, før du går i gang med at gøre sprøjten og pumpen klar. Du skal bruge følgende remedier:

- Gammanorm®
- Optrækskanyle
- Infusionssæt
- Pumpe
- Plaster
- Kanylebøtte
- Sprints wabs
- Dagbog.

Det er vigtigt, at du *ikke* rører ved membran og studser.

Sørg for, at de flader, du lægger remedierne på, er rene. Det forhindrer at remedierne bliver beskidte, og du får en infektion.

Følg vejledningen på næste side

På næste side finder du en vejledning til, hvordan du stikker dig selv med Gammanorm®.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Infektionsmedicinsk Afdeling

Sygeplejerske:
Tlf. 97 66 39 18

SÅDAN INDSPRØJTER DU GAMMANORM®



- Sæt optrækskanylen i medicinen Immunoglobulin, Gammanorm®, 20 ml.



- Træk stemplet tilbage til cirka 15 ml på sprøjten.
- Skru sprøjten på optrækskanylen, og træk immunoglobulinet op ved at skubbe lidt luft ind ad gangen.



- Skru sprøjten af optrækskanylen.
- Hvis der er luft i sprøjten, skal du forsigtigt trykke den ud. Sæt slangen og nålen (infusionssættet) på sprøjten.



- Sprit huden af og stik nålen i huden.
- Træk derefter stemplet på sprøjten tilbage, hvis der kommer blod i slangen, skal du tage nålen ud og placere den et nyt sted.
- Når nålen ligger rigtigt, skal du skrue stemplet af sprøjten, og sætter sprøjten på pumpen. Nu kan du tænde pumpen.



- Sæt batch-nummeret i din infusionsdagbog.