

Behandling af malaria

Du er indlagt med malaria eller mistanke herom, og du skal behandles på Infektionsmedicinsk Afdeling.

Malaria er en akut febersygdom forårsaget af en parasit, som overføres fra menneske til menneske af Anopheles-myg. Disse stikker om aftenen og om natten og er almindelige i tropene, især tropisk Afrika, sjældnere i subtropiske og tempererede lande.

Der er 4 malariaparasitter, der angriber mennesker:

- Plasmodium falciparum
- Plasmodium vivax
- Plasmodium ovale
- Plasmodium malariae.

Førstnævnte, der er den farligste, kan medføre hjernemalaria og andre livstruende tilstande, de øvrige typer er mere godartede. Tiden, fra du er smittet, til sygdommen kommer i udbrud, er mindst 1 uge og oftest få uger. Tiden, fra du er smittet, til symptomerne starter, kan undertiden, for de mindre farlige typer, være op til flere år.

SÅDAN VISER SYGDOMMEN SIG

Symptomerne kan komme gradvist med langsomt stigende feber og kan ligne influenza. Ofte kommer der dog akutte feberanfald med 1-3 dages mellemrum med kulderystelser, fulgt af tør varme og derefter svedeture. Endvidere er der tit hovedpine og muskelsmerter og af og til opkastninger, diarré og mavesmerter.

Undersøgelse for malaria

Diagnosen stilles ved mikroskopi af en blodråbe, også kaldet en malariaudstrygning. Denne undersøgelse kan gentages 3 dage i træk, hvis første prøve er negativ.

SÅDAN SKAL DU BEHANDLES

Sygdommen behandles med medicin. Der findes flere malariamidler, fx Riamet, Kinin, Fansidar, Lariam, Malarone og Artesunate.

Valget af lægemiddel er dels afhængig af de mulige bivirkninger, dels af malariaparasittens resistens i det pågældende område. Bivirkninger svinder oftest hurtigt efter behandlingens ophør.

Udskrivelse kan ske, når du har det bedre, hvis der har været tale om én af de godartede former, eventuelt medgives medicin, og du skal henvende dig til egen læge ved bivirkninger. Ved Falciparum-malaria kan du udskrives, når malariaudstrygningerne er negative, og du er i bedring.

Bliver jeg helt rask igen?

Malaria kan helbredes med den korrekte og rettidige medicinske behandling.

Malaria kan komme igen

Man er desværre ikke beskyttet efter sygdommen. Ved rejser til områder med malariamyg er det vigtigt at tage korrekt forebyggende behandling for at undgå ny smitte.

Kontrol efter udskrivelse

Ved Falciparum-malaria skal der laves ny malariaudstrygning efter 7 dage og 28 dage. Ved tilbagefald af feber inden for 3 måneder, skal du henvende dig til din egen læge.

...fortsættes

KONTAKT OG MERE VIDEN

Hvis du har spørgsmål, til det du har læst, er du meget velkommen til at henvende dig til personalet.



Kontakt

Infektionsmedicinsk Afdeling

Tlf. 97 66 39 20

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00