

Behandling med Imurel®

Du skal i behandling med medicinen Imurel®. Imurel® anvendes mod forskellige sygdomme, hvor man ønsker at hæmme immunsystemet, fx ved visse former for kronisk leverbetændelse, kronisk tarmbetændelse eller efter transplantation af fx hjerte, lever og nyrer.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Det virksomme stof i Imurel® er azathioprin. Stoffet virker ved at hæmme celledelingen hos såvel normale som syge celler.

Medicinen virker oftest først efter 2-4 måneders behandling, og derfor er medicinen primært forebyggende mod tilbagefald af sygdommen. Behandlingsvarigheden er flere år.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Imurel® findes som tabletter i styrkerne 25 mg og 50 mg. Hvor stor en dosis du skal have, afhænger af sygdommens art og din kropsvægt. Almindeligvis ligger dosis på 100-200 mg per dag. Du skal tage tabletterne 1 gang om dagen på et hvilket som helst tidspunkt.

Blodprøver

Det kan variere meget, hvilken dosis medicin der er optimal og uden bivirkninger. Derfor skal du jævnligt have taget blodprøver, som viser, om du får den rette dosis. Du får taget blodprøver 2 og 4 uger efter behandlingens start. Herefter får du taget kontrolblodprøver hver 3.-4. måned for fortsat at sikre, at din behandling er optimal og uden bivirkninger.

BIVIRKNINGER

Imurel® kan give følgende bivirkninger:

- Kvalme
- Opkast
- Diarre
- Udslæt
- Infektion. Medicinen virker hæmmende på dannelsen af de hvide blodlegemer, og det giver øget risiko for infektion.
- Træthed, åndenød og svimmelhed. Medicinen hæmmer også dannelsen af de røde blodlegemer, så der kan opstå blodmangel. Det viser sig som træthed, åndenød og svimmelhed.

Bivirkningerne kan komme i forbindelse med behandlingen, og nogle oplever først bivirkninger langt inde i behandlingsforløbet. I næsten alle tilfælde genvinder cellerne deres normale funktion, når medicindosis sættes ned, eller når du stopper med at tage medicinen. Dermed ophører bivirkningerne.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Undgå Imurel®, hvis du har dårlig knoglemarv

Du må ikke tage Imurel®, hvis din knoglemarv i forvejen fungerer dårligt.

Fortæl lægen, hvilken medicin du tager

Virkingen af Imurel® øges, hvis du samtidig tager gigtmedicinen Allopurinol. Det er derfor vigtigt, at du fortæller lægen om al den medicin, du tager.

Beskyt dig mod solen

Imurel® øger hudens følsomhed for sollys. Derfor er det vigtigt, at du beskytter dig ekstra mod solskoldning. Brug solcreme, og undgå solbadning og solarium.

Få tilskud til medicinen

Imurel® er receptpligtig, og Sygesikringen giver tilskud. Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark kan få reduceret egenbetalingen helt eller delvist.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

**Medicinsk Gastroenterologisk
Ambulatorium**

Tlf. 97 66 35 05

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00