



Fibroskanning

Du skal have lavet en undersøgelse, som kan måle leverens stivhed – en såkaldt fibroskanning.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Ved undersøgelsen skal du ligge fladt på ryggen på et lege med højre arm over hovedet.

Vi placerer et skanningshoved over din lever og måler levervævets stivhed ved hjælp af lydbølger. Øget leverstivhed er udtryk for øget mængde af arvæv (fibrose), hvilket kan ses i forbindelse med kroniske leversygdomme.

Undersøgelsen varer cirka 20 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Mød fastende til undersøgelsen

Møder du ikke fastende til undersøgelsen, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise eller drikke fra 4 timer inden undersøgelsen.
- Du må ikke ryge fra 4 timer inden undersøgelsen.
- Får du væske eller parenteral ernæring igennem en blodåre, skal du stoppe senest 4 timer inden undersøgelsen.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Vi kontakter dig direkte, når vi har svar på undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

CET-Laboratoriet, Center for Ernæring og Tarmsvigt

Tlf. 97 66 35 73

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00