

# Behandling med infliximab

Du skal i behandling med infliximab. Infliximab anvendes til behandling af Crohns sygdom, colitis ulcerosa og fistler (unormal åbning fra tarmen til fx huden), hvor anden behandling ikke har været effektiv.

Cirka 70 % af patienter behandlet med infliximab har effekt af behandlingen. Behandlingen er ikke helbredende, og der er ofte behov for længerevarende vedligeholdelsesbehandling hver 6.-12. uge.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Infliximab er medicin, som hæmmer betændelsestilstanden i tarmen.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

### Undersøgelse for tuberkulose

Infliximab nedsætter immunforsvaret mod blandt andet tuberkulose. Derfor skal du have taget en blodprøve, før du får infliximab, for at sikre, at du ikke har tuberkulose.

### Sådan får du infliximab

Du får infliximab via drop. Du får lagt et tyndt plastikrør (venflon) i en blodåre i din hånd. Infusionen (overførslen) af infliximab sker via et drop. De første 3 gange er infusionstiden 120 minutter. Fra 4. gang nedsættes infusionstiden til 30 minutter. Derudover skal du afsætte tid til blodprøvetagning.

Vi gentager behandlingen 2 og 6 uger efter første infusion. Herefter tager vi stilling til, om du skal fortsætte hver 8. uge i 1 år.

## BIVIRKNINGER

I forbindelse med infusionen af infliximab, og i kort tid efter, kan der i sjældne tilfælde opstå allergisk reaktion. Symptomerne er:

- udslæt på huden
- nældefeber
- træthed
- vejrtrækningsbesvær
- smerter i brystet
- fald eller stigning i blodtrykket.

Opstår symptomerne, mens du får infliximab, nedsætter vi infusionshastigheden eller standser behandlingen, indtil symptomerne er væk. Herefter kan infusionen begynde igen. Symptomerne kan også behandles med anden medicin. Du vil oftest få symptomer på allergisk reaktion 2. gang, du får infliximab eller senere.

Herudover er der oftest ingen bivirkninger. Eventuelle bivirkninger er oftest lette til moderate og kræver ingen behandling. Følgende bivirkninger er set:

- Hovedpine
- Kvalme
- Opkastning
- Diarré
- Mavesmerter
- Træthed
- Svimmelhed
- Feber
- Udslæt
- Kortåndethed
- Hæshed
- Hoste
- Smerter i led
- Vandladningsproblemer.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Du må ikke få infliximab, hvis du har en infektion såsom halsbetændelse eller lungebetændelse.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

**Medicinsk Gastroenterologisk  
Dagafsnit**

Tlf. 97 66 35 05

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 10.00 – 14.00