

Når du skal have 3 døgns kontinuerlig glukosemåling med iPro2

Du skal have foretaget en 3 døgns kontinuerlig glukosemåling med en iPro2. iPro2 er en monitor, der automatisk overvåger dit glukoseniveau over en længere periode. Du skal også selv foretage blodsuktermålinger i måleperioden, så målingerne efterfølgende kan sammenlignes.

SÅDAN GØR DU

1. dag

Den dag, hvor du har fået monteret iPro2, skal du gøre følgende:

- Mål blodsukker 1 time efter iPro2 er monteret.
Klokken:

- Mål blodsukker 3 timer efter iPro2 er monteret.
Klokken:

Brug skemaet

Herefter skal du udfylde det udleverede skema. Mål selv dine blodsukkerværdier og notér alle værdierne i skemaet. Det er vigtigt, at du måler de 4 blodsukre, som er krævet, hver dag.

3. dag

Inden du skal have afmonteret iPro2, skal du måle 3 blodsukre.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Hvis der er tegn på betændelse

Opstår der varme, ømhed eller rødme omkring iPro2, kan det være tegn på betændelse, og du skal kontakte os på ovenstående telefonnummer.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Her du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Endokrinologisk Bioanalytisk Afsnit

Tlf. 97 66 36 03

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00