

# Kontinuerlig glukosemåling i 6 døgn med iPro2

Du skal have målt dine glukoseværdier kontinuerligt over en periode på 6 døgn.

Du får sat en måler og en sensor (iPro2) på din mave, som du skal have på i 6 døgn.

Sensoren måler automatisk glukoseværdien i underhuden hver 5. minut. Sensoren har et måleområde på 2,2 – 22, 2 mmol/l.

Måleren opsamler og lagrer alle glukosemålinger.

## SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Vi placerer sensoren i dit maveskind. Sensoren bliver sat ind ved et prik i huden på maven.

Herefter viser vi dig, hvordan du håndterer udstyret. Vi vil også undersøge, om dit eget blodsukkerapparat fungerer, som det skal.

Det tager cirka 30 minutter både at sætte sensoren på og at fjerne den igen efter 6 døgn.

### Mål dit blodsukker

I de 6 døgn du har sensoren på, skal du samtidig måle dit blodsukker på dit eget blodsukkerapparat 4 gange i døgnet.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Medbring dit blodsukkerapparat

Medbring dit blodsukkerapparat, når du skal have sat sensoren på, og når du skal have taget den af igen. Har du ikke et blodsukkerapparat, eller kan du ikke måle dit blodsukker, vil vi sørge for at hjælpe dig med dette.

### Spis et normalt morgenmåltid

Spis et normalt morgenmåltid og tag din vanlige medicin, så dit blodsukker ligger stabilt, inden sensoren bliver sat på.

## NÅR DU KOMMER HJEM

### Svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen per brev eller ved førstkomende samtale med lægen.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Osteoporoseklinikken

Tlf. 97 66 36 00 – Tast 1

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.00