

Operation for byld ved endetarmen

Byld ved endetarmen opstår oftest fra kirtlerne i endetarmskanalen og kan herfra sprede sig i alle retninger.

Oftest er der tale om en få centimeter stor overfladisk byld tæt ved endetarmsåbningen. I sjældnere tilfælde kan bylden blive betydeligt større og sprede sig op langs endetarmen, ud i balderne eller op mod pungen/skamlæberne.

I forbindelse med bylden findes der ofte en fistel, det vil sige en tynd ekstraforbindelse fra endetarmen og ud til huden, eventuelt gennem lukkemusklen.

Symptomerne på en byld ved endetarmen er oftest smerter, feber og eventuel udtømmelse af pus eller blod.

Du bedes møde til operation i Hobro på Kirurgisk Dagafsnit, 4. sal

_____dag den _____ klokken _____

Vær opmærksom på, at mødetidspunktet ikke er operationstidspunktet. Sæt hele dagen af til operationen

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Mød fastende til aftalen

Du skal faste inden narkosen, så din mavesæk er helt tom. Det er vigtigt, så der ikke opstår risiko for, at mad i mavesækken kan løbe tilbage gennem spiserøret og ned i lungerne. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise fra 6 timer inden undersøgelsen eller behandlingen. Du må ikke ryge, tygge tyggegummi, spise pastiller og lignende de sidste 2 timer før operationen.
- For dit velbefindende før og efter narkosen anbefaler vi, at du drikker et stort glas saft 2 timer før den planlagte undersøgelse eller behandling og derefter ingenting, til narkosen er overstået.

Følg disse retningslinjer, medmindre narkoselægen har givet dig anden vejledning.

Vask dig grundigt før operationen

Tag et bad om morgenen, og vask dig grundigt med vand og sæbe – særligt på stedet for indgrebet. Tag også renvasket tøj på. Undlad smykker, piercing, og lignende genstande, der er samlested for bakterier. Undlad også at smøre dig ind i fed creme, da det gør det vanskeligt at desinficere dig inden operationen. Så har du gjort det, du kan, for at mindske risikoen for infektion.

Køb smertestillende medicin

Vi anbefaler, at du køber smertestillende håndkøbsmedicin inden operationen, så du har det ved behov i den første tid hjemme.

Medbring medicin

Medbring din daglige medicin - både kosttilskud og anden medicin samt spray og inhalationsmedicin. Ved forundersøgelsen aftaler vi, hvilken medicin du skal tage og hvornår du skal tage den på operationsdagen.

Tag følgende medicin på operationsdagen:

Hvis du tager blodfortyndende medicin

Tager du Marevan®, Plavix® eller Persantin® vil du ved forundersøgelsen blive vejledt i, hvordan du skal tage medicinen inden indgrebet

Du får fjernet hår

Inden operationen får du i sengeafsnittet fjernet eventuelle hår i operationsfeltet.

SÅDAN FOREGÅR OPERATIONEN

Under operationen er du fuldt bedøvet

Inden du bliver bedøvet, bliver du koblet til et drop, som giver dig væske gennem et plastikrør i håndryggen. Lægen, der skal operere, taler først med dig om, hvad der skal foregå, og herefter bliver du bedøvet.

Selve operationen

Lægen åbner til bylden, og betændelsen bliver udtømt.

Såret efterlades åbent til spontan heling.

Hvis der samtidig findes en fistel, behandles den almindeligvis senere.

Ved operationens afslutning lægges ofte et sår-produkt i såret. Dette falder let ud ved skylning af såret.

EFTER OPERATIONEN

Efter et ophold i opvågningsafsnittet kommer du tilbage til sengeafsnittet. Alt efter din tilstand og operationens omfang bliver du udskrevet i løbet af eftermiddagen.

Hurtigt ud af sengen

Når du kommer tilbage til sengeafdelingen, skal du ud af sengen og gå en tur. Du må også gerne spise og drikke efter lyst og evne.

Kvalme, smerter og vandladning

Vi tilstræber at du har haft vandladning, inden du bliver udskrevet. Det er dog ikke en hindring for, at du kan blive udskrevet. Har du ikke haft vandladning før sengetid, er det dog vigtigt, at du kontakter Lægevagten.

Du kan også opleve at have kvalme og/eller smerter inden du skal udskrives. Det er heller ikke en hindring for at du kan komme hjem.

Aftal at blive hentet af en pårørende

Sørg for at have en pårørende til at ledsage dig eller køre dig hjem. Du må ikke selv køre bil det første døgn efter, at du har været bedøvet.

MULIGE KOMPLIKATIONER

- **Åbent sår:** Det kan i løbet af de første dage efter operationen vise sig, at den primære udtømmelse af bylden ikke var tilstrækkelig, hvorfor ny undersøgelse og operation i fuld bedøvelse kan blive nødvendig.
I nogle tilfælde ses - efter heling af såret - en fistel, som kan kræve senere operation eller anden form for lukning.
- I sjældne tilfælde (mindre end 2 %) er der tale om stor byld med påvirkning af lukkemuskelfunktionen eller så omfattende udbredelse, at helingen vil sinkes betydeligt pga. afgang af afføring tæt ved såret. I sådanne sjældne tilfælde kan det midlertidigt blive nødvendigt at føre tarmen ud i siden (kostomi).



NÅR DU KOMMER HJEM

Forvent smerter efter operationen

Du kan forvente at have smerter de første dage efter operationen.

Hvis du får brug for stærkere smertestillende medicin, vil du få den udleveret sammen med en vejledning i, hvordan du skal tage den.

Hold maven i gang

Du kan opleve at have hård mave på grund af bedøvelsen. Hold maven i gang med fx svesker, sveskejuice, kosttilskud med loppefrøskaller eller tabletter med magnesiumoxid (fås i håndkøb på apoteket). Husk også at bevæge dig og at drikke 1½ – 2 liter væske dagligt.

Efter udskrivelsen

Efter udskrivelsen skal du huske følgende.

- Du må ikke køre bil det første døgn.
- Du skal undgå karbad og svømmehal, indtil trådene er fjernet.
- Såret skal skylles dagligt med bruser. Afhængig af sårets størrelse bestilles sårpleje ved en hjemmesygeplejerske og eventuelt ambulante kontrol i vores ambulatorium cirka hver 14. dag, indtil såret er helet. Du kan genoptage dit arbejde efter aftale med lægen.
- Dagen efter operationen må du genoptage almindelige aktiviteter som gang, cykling, løb, husarbejde og seksuelt samvær. Aktiviteterne må ikke udløse smerter.
- Du vil blive informeret om et eventuelt løfteforbud.

Hvis du oplever tiltagende smerter

Hvis du oplever tiltagende smerter, feber og utilpashed skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til operationen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Kirurgisk Dagafsnit Hobro

Tlf. 97 65 26 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Kirurgisk Ambulatorium Hobro

Tlf. 97 65 20 80

Mandag – fredag 8.00 – 15.00