

Behandling med Mercaptopurinum

Du skal i behandling med medicinen Mercaptopurinum. Mercaptopurinum anvendes mod forskellige sygdomme, hvor man ønsker at hæmme immunsystemet, fx ved visse former for kronisk leverbetændelse, kronisk tarmbetændelse eller efter transplantation af fx hjerte, lever og nyrer.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Det virksomme stof i Mercaptopurinum er mercaptopurin. Stoffet virker ved at hæmme celledelingen hos såvel normale som syge celler.

Medicinen virker oftest først efter 2-4 måneders behandling, og derfor er medicinen primært forebyggende mod tilbagefald af sygdommen. Behandlingsvarigheden er flere år.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Mercaptopurinum findes som tabletter i styrken 50 mg. Hvor stor en dosis, du skal have, afhænger af sygdommens art og din kropsvægt. Almindeligvis ligger dosis på 50-100 mg per dag. Du skal tage tabletterne 1 gang om dagen på et hvilket som helst tidspunkt.

Du får Mercaptopurinum gratis i Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit.

Blodprøver

Det kan variere meget, hvilken dosis medicin der er optimal og uden bivirkninger. Derfor skal du jævnligt have taget blodprøver, som viser, om du får den rette dosis. Du får taget blodprøver 2 og 4 uger efter behandlingens start. Herefter får du taget kontrolblodprøver hver 3.-4. måned for fortsat at sikre, at din behandling er optimal og uden bivirkninger.

BIVIRKNINGER

Mercaptopurinum kan give følgende bivirkninger:

- Kvalme
- Opkast
- Diarré
- Udslæt
- Infektion. Medicinen virker hæmmende på dannelsen af de hvide blodlegemer, og det giver øget risiko for infektion.
- Træthed, åndenød og svimmelhed. Medicinen hæmmer også dannelsen af de røde blodlegemer, så der kan opstå blodmangel. Det viser sig som træthed, åndenød og svimmelhed.

Bivirkningerne kan komme i forbindelse med behandlingen, og nogle oplever først bivirkninger langt inde i behandlingsforløbet. I næsten alle tilfælde genvinder cellerne deres normale funktion igen, når medicindosis sættes ned, eller når du stopper med at tage medicinen. Dermed ophører bivirkningerne.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Undgå Mercaptopurinum, hvis du har dårlig knoglemarv

Du må ikke tage Mercaptopurinum, hvis din knoglemarv i forvejen fungerer dårligt.

Fortæl lægen, hvilken medicin du tager

Virkningen af Mercaptopurinum øges, hvis du samtidig tager gigtmedicinen Allopurinol. Det er derfor vigtigt, at du fortæller lægen om al den medicin, du tager.

Beskyt dig mod solen

Mercaptopurinum øger hudens følsomhed for sollys. Derfor er det vigtigt, at du beskytter dig ekstra mod solskoldning. Brug solcreme, og undgå solbadning og solarium.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 35 05

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00