

# Behandling med ursodeoxycholsyre

Du skal i behandling med ursodeoxycholsyre. Lægemidlet ordineres af en speciallæge og udleveres til dig i en prøveperiode.

Hvis du skal i langtidsbehandling, får du en recept på ursodeoxycholsyre første gang ved os. Receptfornyelsen overgår til din egen læge efterfølgende.

## Læs denne information grundigt

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen. Gem informationen, for du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, kan du kontakte lægen på sygehuset. Lægen har ordineret medicinen til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Ursodeoxycholsyre er det aktive stof i den medicin, du har fået udleveret. 1 kapsel indeholder 250 mg ursodeoxycholsyre. De øvrige indholdsstoffer i lægemidlet fremgår af indlægssedlen. Medicinen er gelatinekapsler, som fås i æsker a 100 styk.

Ursodeoxycholsyre virker ved at øge omsætningen af galdesyre og ændrer galdesyrens sammensætning. Ursodeoxycholsyre anvendes til behandling af:

- lever- og galdesygdomme, såsom primær biliær cirrose (PBC, autoimmun leversygdom) og primær skleroserende cholangitis (PSC, autoimmun leversygdom)
- cystisk fibrose
- leverrelateret graviditetskløe.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte patient har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

## For voksne

Til behandling af PBC, PSC, cystisk fibrose og leverrelateret graviditetskløe er den daglige dosis 10-15 mg/kg. Det svarer som regel til 2-3 kapsler. Du kan tage kapslerne ved sengetid, og du skal synke dem hele med vand.

## For børn

Dosis afhænger af kropsvægt. Følg lægens anvisning.

## Hvis du glemmer at tage medicinen

Glemmer du at tage din medicin en dag, må du ikke tage dobbeltdosis den følgende dag. Du skal vente, til det er tid til at tage den næste dosis, og derefter fortsætte normalt med den behandling, lægen har ordineret.

## Hvis du har taget for meget medicin

Hvis du har taget mere ursodeoxycholsyre end anvist af lægen eller i denne information, skal du kontakte lægen i dagtimerne, herefter Lægevagten.

## Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler og stærke vitaminer og mineraler.

Tager du kolesterolsænkende medicin med indholdsstofferne colestyramin eller cholestipol, kan disse nedsætte virkningen af ursodeoxycholsyre.

Tager du mavesyre-neutraliserende medicin, der indeholder aluminium, skal du tage denne medicin 2 timer før eller 2 timer efter, du har taget ursodeoxycholsyre.

Ursodeoxycholsyre kan nedsætte virkningen af antibiotikummet ciprofloxacin.

## BIVIRKNINGER

Ursodeoxycholsyre kan som al anden medicin give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- Hovedpine
- Træthed
- Kvalme
- Opkastninger
- Fordøjelsesbesvær
- Diarré
- Fornemmelse af metalsmag i munden.

Disse bivirkninger fortager sig ofte efter 1-2 uger.

Fortæl lægen, hvis du får andre bivirkninger end dem, der er beskrevet her. Lægen vil så indberette bivirkningerne til Lægemiddelstyrelsen.

Fortæl lægen, hvis du får bivirkninger, som er vedvarende og generende.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

### Tag ikke medicinen, hvis

- du har betændelse i galdeblæren (cholecystitis)
- du har akut betændelsestilstand i galdevejene (cholangitis).

### Graviditet og amning

Hvis du er gravid, bør du kun tage ursodeoxycholsyre, hvis du har leverrelateret graviditetskløe. Følg altid lægens anvisning.

Der er begrænsede erfaringer med ursodeoxycholsyren. Spørg derfor lægen til råds om amning.

### Opbevaring

Ursodeoxycholsyre skal opbevares utilgængeligt for børn. Anvend ikke ursodeoxycholsyre efter den udløbsdato, som står på pakken.

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 35 05

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00