

# Behandling med Entyvio

Du skal i behandling med medicinen Entyvio. Entyvio anvendes til behandling af moderate til svære tilfælde af Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, hvor anden behandling ikke har været effektiv.

Formålet med behandlingen er at reducere og helt eller delvist fjerne symptomer og at bringe betændelsen i ro.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Entyvio indeholder medikamentet vedolizumab, som hæmmer betændelsestilstanden i tarmsystemet.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du får Entyvio via et drop. Du får lagt et tyndt plastik rør (venflon) i en blodåre i din hånd. Infusionen (overførslen) af Entyvio via droppet tager cirka 30 minutter. Du skal også afsætte tid til blodprøvetagning ved hver behandling.

Du vil som udgangspunkt få 3 infusioner med Entyvio. Du skal have 2. infusion efter 2 uger og 3. infusion efter yderligere 4 uger.

Vi vurderer medicinens virkning efter 3. infusion og tager stilling til, om du skal fortsætte behandlingen hver 8. uge i 1 år for at holde sygdommen i ro.

Du kan først forvente at mærke effekt af medicinen efter 6 uger. For nogle patienter med Crohns sygdom kan der dog gå op til 10-14 uger.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Før du får Entyvio, er det vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du:

- har en alvorlig infektion - du kan ikke få Entyvio, før infektionen er under kontrol
- er gravid eller planlægger at blive det
- har leverproblemer
- har tuberkulose eller været i kontakt med nogen, der har tuberkulose.

## BIVIRKNINGER

### Bivirkninger

Entyvio kan som al anden medicin give bivirkninger, men de er få, og de fleste bivirkninger er milde. Mere end 10 % af patienterne oplever dog forkølelse, hovedpine og/eller ledsmerter.

1-10 % af patienterne oplever:

- bronkitis
- infektion i de øvre luftveje
- bihulebetændelse
- ondt i halsen
- forhøjet blodtryk
- udslæt
- kløe
- eksem
- influenza eller influenzalignende symptomer
- kvalme
- opkastning
- diarré
- mavesmerter.

### Allergiske reaktioner

Nogle ganske få patienter kan få en allergisk reaktion i forbindelse med infusionen. Det vil oftest være ved 2. infusion eller senere.

De fleste symptomer på allergisk reaktion er milde:

- Hovedpine
- Kløe
- Varmefornemmelse
- Rødme
- Trykken for brystet
- Åndenød

Opstår symptomerne under infusionen, nedsætter vi infusionens hastighed eller standser behandlingen, indtil symptomerne forsvinder. Herefter kan infusionen oftest begynde igen.

Symptomerne kan også behandles med medicin.

I meget få tilfælde kan den allergiske reaktion være så alvorlig, at vi er nødt til at standse behandlingen helt. I så fald aftales den videre behandlingsplan med lægen.

### **Sig til, hvis du oplever ubehag**

Det er vigtigt, at du fortæller lægen eller sygeplejersken, hvis du tror, du har fået en bivirkning under eller efter behandlingen.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### **Kontakt**

#### **Medicinsk Gastroenterologisk**

#### **Dagafsnit**

Tlf. 97 66 35 05

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 10.00 – 15.00