

Punktur af levercyste med alkoholinjektion

Vi har konstateret, at du har større, overfladiske cyster i leveren, som har gendannet sig, selvom vi har tømt dem flere gange. Punktur af cysterne skal forhindre, at cysterne dannes igen.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Under behandlingen er du lokalbedøvet i huden over leveren. Du bliver ultralydsskannet, så lægen kan se, hvor cysterne sidder. Mens du bliver ultralydsskannet, fører lægen en kanyle ind i cysterne og tømmer dem for væske. Derefter sprøjter lægen alkohol ind i cysterne. Alkoholene ligger i cysterne i cirka 10 minutter, hvorefter lægen fjerner den igen. Senere skulle cysterne gerne klistre sig sammen, så de ikke længere kan fyldes med væske.

Behandlingens varighed afhænger af, hvor mange cyster der skal punkteres.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Vær opmærksom på medicin

- Får du insulin, skal du undlade at tage din morgenmedicin. Medbring din insulin til undersøgelsen, og tag halv morgendosis efter undersøgelsen i forbindelse med det første måltid mad.
- Får du tabletbehandling mod sukkersyge, skal du tage din medicin, som du plejer.
- Lægen, der har besluttet, at du skal have tømt cyster, skal gerne have taget stilling til, om du skal holde pause med blodfortyndende medicin inden behandlingen. Hvis du ikke har fået besked herom, skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsesdagen med henblik på regulering af den blodfortyndende medicin.
- Får du Plavix® (clopidogrel) eller Hjertemagnyl®, skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsen med henblik på, om du skal holde pause med denne medicin.

- Får du anden medicin, må du tage den med lidt vand om morgenen.

Mød fastende til aftalen

Du skal faste inden behandlingen, så din mavesæk er helt tom. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise fra midnat inden behandlingen. Du må heller ikke drikke eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.
- Du må tage medicin i henhold til ovenstående retningslinjer.

Bestil tid til en blodprøve inden aftalen

Vi skal bruge en blodprøve fra dig 1-2 dage inden aftalen. Blodprøven kan kun tages på et sygehus i Region Nordjylland

EFTER BEHANDLINGEN

Vær fastende i 2 timer

Efter behandlingen skal du faste i 2 timer.

Bliv i sengen i 1 time

Du skal blive i sengen i 1 time. Du får målt blodtryk, puls og vejrtrækning regelmæssigt i den periode.

Tag hjem

Når der er gået 1 time uden tegn på komplikationer, må du tage hjem, men du bør ikke køre bil selv.

KOMPLIKATIONER

Efter behandlingen kan du have lette smerter, som vi kan behandle med et smertestillende middel. Bliver du svimmel, utilpas eller får smerter, efter du er kommet hjem, skal du kontakte Medicinsk Gastroenterologisk Sengeafsnit.

Meget sjældent (1-3 ud af 1000 behandlinger) kan der forekomme blødning eller alkoholudsivning i bughulen, men det kræver sædvanligvis ikke nogen særlig behandling.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit

Sekretær

Tlf. 97 66 35 58
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Sygeplejerske

Tlf. 97 66 35 05
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 10.00 – 15.00

Medicinsk Gastroenterologisk Sengeafsnit 9Ø

Tlf. 97 66 35 01