

Botulinumtoxin-indsprøjtning mod spastiske muskler

Du skal have indsprøjtninger mod spastiske/dystone muskler med botulinumtoxin.

Indsprøjtningerne skal mindske muskelspændinger og smerter og forbedre funktionen af de spastiske muskler.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Botulinumtoxin bremser signalerne fra nerver til muskler, og gør, at musklen bliver svagere. Du mærker effekten af indsprøjtningerne i løbet af 14 dage, og effekten varer oftest 3-4 måneder. Efter cirka 1 måned vil du opleve den største virkning.

Behandlingen skal gentages

Da virkningen ikke er varig, skal behandlingen gentages med 3-4 måneders mellemrum. Du bliver automatisk indkaldt til de kommende behandlinger.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Indsprøjtningerne bliver givet i de muskler, som skal behandles. Der er ikke nogen særlige forholdsregler inden indsprøjtningerne. Du skal tage eventuel medicin som normalt.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve, at andre muskler i nærheden af de, der er blevet behandlet, vil være svagere end normalt. Det afhænger af, hvilke muskler der er blevet behandlet. Du kan mærke stikkene og selve indsprøjtningerne som let ubehagelige, selvom nålen er tynd og den mængde, der indsprøjtes, er lille. I enkelte tilfælde vil du opleve influenza-lignende symptomer.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Ved tab af muskelkraft udover det planlagte, skal du kontakte Klinisk Neurofysiologisk Afdeling eller egen læge.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Klinisk Neurofysiologisk Afdeling

97 66 22 90 / 97 66 22 91

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 10.00 – 14.00