

Behandling af svær spasticitet med Baclofenpumpe

Du er blevet tilbudt behandling af svær spasticitet med en Baclofenpumpe. Det er en behandling, hvor medicinen ved hjælp af en indopereret Pumpe føres via et kateter direkte ind i rygsøjlen og ind i rygmarvsvæsken.

Behandlingen kan ikke helbrede den sygdom, der ligger til grund for spasticiteten, men den kan afhjælpe symptomerne og give bedre funktionalitet og livskvalitet med få bivirkninger.

HVEM TILBYDES BEHANDLINGEN

Lider du af svær spasticitet og har forsøgt behandling med Baclofen i tabletform (Baklofen eller Lioresal), og dette ikke har haft tilstrækkelig effekt, eller der har været udtalte bivirkninger, kan Baclofenpumpen være en løsning.

SÅDAN VIRKER BACLOFENPUMPEN

Pumpen opereres ind under maveskindet, hvorfra der går et tyndt plastik kateter om til rygsøjlen og ind i rygmarvsvæsken. Her kan medicinen virke direkte på de nerveceller, der sidder i rygmarven.

Da medicinen er tæt på det sted, hvor det skal virke, kan man nøjes med meget små doser. Da medicindoserne er små, oplever de fleste kun få bivirkninger til behandlingen.

Pumpen kan programmeres, så den giver lige præcis den mængde medicin, du har brug for, således det virker på dine symptomer, og uden du får voldsomme bivirkninger.

Afhjælper primært spasticitet i benene.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Testdosis

Inden det besluttes, om du vil have gavn af pumpen, vil du udover at tale med en læge også få en testdosis, som foregår ved, at en dosis af medicinen sprøjtes ind i din rygmarvsvæske. Herefter vil lægen observere, hvilken virkning medicinen har på din spasticitet og ud

fra det vurdere, om du vil have gavn af at få Baclofen direkte i rygmarvsvæsken. Denne test foregår aktuelt på Aarhus Universitetshospital.

Operation

Hvis lægen vurderer, at du vil have gavn af pumpen bliver du tilbudt at få indopereret en Pumpe. Operationen foregår både i Aarhus og i Aalborg.

Kontrol

Når du har fået en baclofenpumpe skal du gå til kontrol og genopfyldning af pumpen i Spasticitets Ambulatoriet på Aalborg Universitetshospital. Det er vigtigt, at du møder op til de aftaler, du har, for at du kan få det bedste resultat af behandlingen og for at sikre, at pumpen fungerer som den skal.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Når du har en Baclofenpumpe, er der ligesom ved alle andre behandlinger visse ting, du skal være opmærksom på. Det vil være en god idé at fortælle dine venner og familie om pumpen.

Fortæl også dine andre læger om pumpen, og hav altid dit ID-kort på dig, hvorpå der står vigtige oplysninger om din behandling.

Overdosering eller medicinmangel

Det er vigtigt, at du og dine pårørende er opmærksomme på symptomer ved en evt. overdosering eller mangel på medicin. Kontakt afdelingen, hvis du oplever følgende:

Symptomer på overdosering:

- Slaphed begyndende i benene
- Sløvhed og døsigthed
- Kvalme og opkastning
- Svimmelhed
- Lav temperatur
- Faldende blodtryk
- Bevidsthedstab

Symptomer ved medicinmangel:

- Slaphed begyndende i benene
- Kløende hud
- Hallucinationer
- Øget temperatur
- Ændringer i blodtryk

Hvis du hører en alarmlyd fra pumpen, skal du tage kontakt til Spasticitets Ambulatoriet hurtigst muligt, da det kan betyde, at det er tid til genopfyldning af medicin, eller at batteriet i pumpen er ved at være opbrugt.

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Kan man rejse, når man har Baclofenpumpe?

Ja, det kan man godt, men husk at få tjekket, om der er nok medicin på pumpen, så den ikke løber tør. Samt medbringe dit id-kort til pumpen.

Kan man MR scannes?

Ja, men kontakt først Spasticitets Ambulatoriet for at få pumpen kontrolleret inden - og måske efter scanningen.

Må man svømme?

Ja, det må man godt.

Må man dykke?

Ja, det må man gerne, men ikke over 2 atmosfæres tryk svarende til ca. 10 meter dybt.

Kan man ligge på maven?

Ja, det kan man godt, men vær opmærksom på, om der opstår tryk eller evt. rødme/sår omkring pumpen.

Kan pumpen aktivere metaldetektorer i lufthavnen?

Ja, det kan den godt, men hvis bare du viser dit id-kort, bør der ikke være problemer.

Hvor lang holdbarhed har medicinen?

Max 180 dage.

Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med behandlingen, er du velkommen til at kontakte Spasticitets Ambulatoriet.



Kontakt

Spasticitets Ambulatoriet

Tlf. 97 66 28 75
eller
Tlf. 97 66 22 58