

Indsættelse af silikoneslange i tårekanalen

Du skal have opereret en silikoneslange ind i tårekanalen for at skabe en bedre forbindelse fra øjets tåresø, gennem tåresækken og ind til næsehulen. På den måde vil tårekanalen udvides og tåreflåd mindskes.

Indgrebet foretages på patienter med tåreflåd, hvor der ikke er betændelse i tåresækken, og hvor afløbet fra tåresækken kun er delvist blokeret.

SÅDAN FOREGÅR OPERATIONEN

Behandlingen foregår på Øjenafdelingens operationsafsnit.

For voksne foregår operationen oftest i lokalbedøvelse, for børn i fuld bedøvelse. Skal du i lokalbedøvelse er kun operationsstedet bedøvet, mens du er vågen. Du vil ikke føle smerte, men kan mærke berøring.

Bedøvelsen består af lokalbedøvende øjendråber, lokalbedøvende indsprøjtning i øjenkrogen samt et såkaldt 'meche', som er et stykke gaze vædet med lokalbedøvende væske, som sættes op i næsen for at bedøve slimhinden.

Selve operationen


Operationen varer cirka 1 time.

Kirurgen indsætter en 0,7 mm tynd, blød silikoneslange gennem tårepunkterne i øjenkrogen til næsehulen, hvor slangens ender bindes sammen. Silikoneslangen bliver fjernet 6 uger senere i Øjenafdelingens Ambulatorium.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Undlad make-up på operationsdagen

Hold øjenomgivelserne rene og fri for make-up på operationsdagen for at undgå infektionsfare. Dette gælder også ansigtscreme.



En silikoneslange lægges gennem tårepunkterne i øjenkrogen og ind til næsehulen. Derved skabes afløb for tåreflåd.

EFTER OPERATIONEN

Drik ikke varme drikke

De første 2 timer efter operationen, må du ikke drikke varme drikke, såsom te eller kaffe, da varmen vil øge risikoen for næseblødning.

NÅR DU KOMMER HJEM

Kontakt straks Øjenafdelingen ved blødning

Hvis der opstår blødning fra næsen efter behandlingen, skal du kontakte Øjenafdelingens Ambulatorium straks.

Dryp med øjendråber

De første 2 uger efter operationen skal du dryppe øjnene 3 gange dagligt med øjendråberne Tobradex. Du får en recept med hjem efter operationen.

Skub eventuelt selv slangen på plads

Hos nogle patienter kan silikoneslangen glide op fra tårepunkterne og ud på øjet. I det tilfælde må du ger-

ne forsigtigt forsøge at skubbe slangen på plads igen med en finger. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du ringe til Øjenafdelingens Ambulatorium og aftale en tid til en kontrol. Ved kontrollen vil øjenlægen forsøge at sætte slangen på plads. Det kan dog blive nødvendigt at fjerne den før tid.

KONTROL

Du skal til kontrol efter 2 måneder. Her fjernes silikoneslangen. Det er først herefter, at du kan forvente bedring.

Der er her en risiko for, at operationen ikke har haft nogen effekt, og derfor skal du til yderligere en kontrol efter 4-6 måneder, hvor vi vurderer resultat af operationen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til operationen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Øjenafdelingens Ambulatorium

Tlf. 97 66 25 85

Mandag – torsdag 8.00 –15.30

Fredag 8.00 –13.30

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 9.00 –13.00

Hverdage 15.30 – 8.00, weekend- og helligdage, kan du få kontakt til os her:

Øjenafdelingens Sengeafsnit

Tlf. 97 66 26 27