

Behandling af kvalme med Ondansetron, Prednisolon og Emperal®

Du kan få kvalme i forbindelse med behandlingen af din kræftsygdom. For at forebygge kvalme skal du i behandling med Ondansetron, Prednisolon og Emperal®.

ONDANSETRON

Du skal tage Ondansetron for at forebygge kvalme og opkastning, som kan opstå efter din kemoterapi og strålebehandling.

Sådan virker medicinen

Ondansetron blokerer frigivelsen af de stoffer i kroppen, der giver kvalme og opkastning.

Sådan foregår den medicinske behandling

Ondansetron findes i flere former:

- Smeltetabletter, som skal lægges under tungen
- Tabletter, som skal synkes med vand
- Stikpiller til endetarmen.

På sygehuset kan Ondansetron desuden gives som væske gennem et drop.

Vi aftaler med dig, hvor meget Ondansetron du skal tage.

Bivirkninger

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Hovedpine.** Du kan lindre hovedpine med smertestillende medicin fra håndkøb.
- **Forstoppelse.** Du kan afhjælpe forstoppelse ved at drikke rigeligt, spise fiberrig kost og eventuelt tage afføringsmiddel.
- **Varme og rødmen i ansigtet.**

Sådan opbevarer du medicinen

Tabletter og stikpiller skal opbevares ved stuetemperatur.

PREDNISOLON

Du skal tage Prednisolon i få dage i forbindelse med din behandling for at forebygge kvalme og opkastning.

Sådan virker medicinen

Prednisolon er et kunstigt binyrebarkhormon, som virker mod kvalme og opkastning.

Sådan foregår den medicinske behandling

Du skal tage Prednisolon som tabletter. Tabletterne fås i forskellige styrker. Dosis er individuel og afhængig af, hvorfor du skal behandles. Startdosis er sædvanligvis højere end vedligeholdelsesdosis. Når du skal afslutte behandlingen, er det vigtigt, at du gradvist nedsætter dosis.

Følg de anvisninger, vi giver dig.

Bivirkninger

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Indre uro og søvnbesvær.** Det er bedst at tage medicinen om morgenen for at undgå søvnbesvær.
- **Øget appetit.**
- **Let øget vægt.** Din vægt kan stige, da der samler sig væske i din krop.
- **Påvirkning af blodsukkeret.** Hvis du er sukker-sygepatient, skal du altid huske at kontrollere dit blodsukker.

Sådan opbevarer du medicinen

Du skal opbevare Prednisolon ved stuetemperatur.

EMPERAL®

Du skal tage Emperal® for at forebygge kvalme og opkastning i forbindelse med din kemoterapi eller strålebehandling.

Sådan virker medicinen

Emperal® blokerer frigivelsen af de stoffer i kroppen, der giver kvalme og opkastning. Desuden virker Emperal® stimulerende på tarmfunktionen, så mavesækken tømmes hurtigere.

Det virksomme stof i Emperal® hedder metoclopramid.

Sådan foregår den medicinske behandling

Emperal® findes som tabletter. Tabletterne skal synkes med vand og virker efter ½ time. Tabletterne skal opbevares ved stuetemperatur.

Du skal tage den dosis Emperal®, som vi har aftalt.

Du kan afhjælpe kvalme i forbindelse med måltider ved at tage Emperal® 1 time før måltidet.

Behandling på sygehuset

Hvis du er indlagt på sygehuset, kan du få Emperal® som væske i et drop.

Bivirkninger

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Døsighed**
- **Indre uro**
- **Besvær med vandladning**
- **Ufrivillige bevægelser.** Hvis du tager Emperal® i lang tid, kan du opleve, at din krop gør ufrivillige bevægelser. De forsvinder igen, når du ikke længere tager medicinen. Husk at fortælle os, hvis du oplever denne bivirkning.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00