

Behandling af kvalme med ondansetron, Prednison og natriumpicosulfat

Du kan få kvalme i forbindelse med behandlingen af din kræftsygdom. For at forebygge kvalme skal du i behandling med Ondansetron og Prednison. For at forebygge forstoppelse som følge af den kvalmestillende medicin skal du tage natriumpicosulfat (i dagligtale kaldet Laxoberal).

ONDANSETRON

Du skal tage Ondansetron for at forebygge kvalme og opkastning, som kan opstå efter din kemoterapi og strålebehandling.

Sådan virker medicinen

Ondansetron blokerer frigivelsen af de stoffer i kroppen, der giver kvalme og opkastning.

Sådan foregår den medicinske behandling

Ondansetron findes i flere former:

- Smeltetabletter, som skal lægges under tungen
- Tabletter, som skal synkes med vand
- Stikpiller til endetarmen.

På sygehuset kan Ondansetron desuden gives som væske gennem et drop.

Vi aftaler med dig, hvor meget Ondansetron du skal tage.

Bivirkninger

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Hovedpine.** Du kan lindre hovedpine med smertestillende medicin fra håndkøb.
- **Forstoppelse.** Du kan afhjælpe forstoppelse ved at drikke rigeligt, spise fiberrig kost og eventuelt tage afføringsmiddel.
- **Varme og rødmen i ansigtet.**

Sådan opbevarer du medicinen

Tabletter og stikpiller skal opbevares ved stuetemperatur.

PREDNISON

Du skal tage Prednison i få dage i forbindelse med din behandling for at forebygge kvalme og opkastning.

Sådan virker medicinen

Prednison er et hormon, som virker mod kvalme og opkastning.

Sådan foregår den medicinske behandling

Du skal tage Prednison som tabletter. Tabletteerne fås i forskellige styrker. Du får Prednison forebyggende i de første dage i forbindelse med kemoterapi.

Vi aftaler med dig, hvor meget Prednison du skal tage.

Bivirkninger

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Øget appetit**
- **Indre uro og søvnbesvær.** Det er bedst at tage medicinen om morgenen for at undgå søvnbesvær.
- **Let øget vægt.** Din vægt kan stige, da der samler sig væske i din krop.

Sådan opbevarer du medicinen

Du skal opbevare Prednison ved stuetemperatur.

NATRIUMPICOSULFAT

Du skal tage natriumpicosulfat, som er et afføringsmiddel, der forebygger forstoppelse. Natriumpicosulfat anvendes mod forstoppelse, som er opstået efter behandling med kvalmestillende medicin.

Sådan virker medicinen

Natriumpicosulfat stimulerer tarmens naturlige bevægelser. Desuden påvirker natriumpicosulfat slimhinden i tarmen, så den udskiller mere væske, så afføringen bliver blødere.

Sådan foregår den medicinske behandling

Du skal tage natriumpicosulfat som dråber.

Vi anbefaler, at du begynder med 10-15 dråber i døgnnet. Har denne dosis for kraftig eller ringe virkning, kan du regulere dosis med 2-5 dråber ad gangen, indtil du får den ønskede effekt.

Virkingen indtræder som regel efter 10-12 timer.

Dråberne har en neutral smag. Du kan blande dem med vand, saft og lignende.

Sådan opbevarer du medicinen

Du skal opbevare dråberne ved stuetemperatur.

Bivirkninger

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Mavekneb.** Du kan undgå mavekneb ved at fordele din daglige dosis på flere gange over dagen.
- **Diarré.** Du kan få diarré, hvis du tager for mange dråber.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00