

# Sådan gør du med modificeret Kleinertstræk på tommelfingeren

Du har fået anlagt et modificeret Kleinertstræk på din tommelfinger, hånd og underarm. For at få det bedst mulige resultat optræningsforløb efter operationen er det vigtigt, at du følger denne vejledning:

- Skinnen må ikke sidde så løst, at din hånd og underarm kan glide i den.
- Sker der noget med skinnen, bør du ringe til ergoterapeuten. Se telefonnummeret i kontaktboksen på næste side.
- Skinnen skal betragtes som en gips, og du må ikke tage den af.

## I DAGTIMERNE

### Aktiver fingeren

Hver 2. time skal du fjerne velcrobåndet og strække din tommelfinger helt ud, hvorefter du slapper af og lader tommelfingeren blive bøjet helt ind i hånden ved hjælp af den anden hånd. Derefter skal du holde denne stilling, mens du aktiverer bøjesenen i den opererede tommelfinger ganske let – i 2-3 sekunder. Derved mindsker du risikoen for, at senen ”gror fast” til det omkringliggende væv. Gentag øvelsen 10 gange.



Stræk tommelfingeren helt ud i skinnen.



Bøj tommelfingeren helt ind i hånden ved hjælp af den anden hånd.

### Lad ikke tommelfingeren bøje af sig selv

Du må ikke lade tommelfingeren bøje af sig selv, da senen så kan bryde. Først 4 uger efter operationen må du lade fingeren bøje af sig selv.

### Brug ikke hånden

Du må ikke bruge hånden til noget, da enhver belastning påvirker den syede sene. Det betyder også, at du fx ikke må køre bil. Dette gælder i 12 uger efter operationen.

### Modvirk hævelse

For at modvirke hævelse bør du strække armen op over hovedet med strakt albue 5-10 gange hver time.

## OM NATTEN

### Behold skinnen og begge stropper på

Når du går i seng, skal du beholde begge stropperne på, så tommelfingeren holdes i en strakt stilling.

## I ØVRIGT

### Sygemeld dig

Du må tidligst begynde at arbejde 12 uger efter operationen.

### Få skinnen fjernet

4 uger efter operationen får du fjernet Kleinertstræket, og du får en håndledsskinne på, som du skal bruge i 2 uger.

### Gå til genoptræning på hospitalet

Du skal gå til behandling i Fysio- og Ergoterapiafdelingen for at genoptræne hånden. Genoptræningen kræver megen forsigtighed og skal ske under vejledning af en terapeut.

### Gå til kontrol

Udover behandlinger hos fysioterapeuten eller ergoterapeuten kan der ved behov planlægges lægekontrol ved håndkirurgen.

### Få fjernet sting

Du skal have fjernet stingene cirka 2 uger efter operationen. Det foregår i Fysio- og Ergoterapiafdelingen.



### Lån eventuelt hjælpemidler

Hvis du har problemer med at klare de daglige gøremål med kun én hånd, kan du låne forskellige hjælpemidler i Fysio- og Ergoterapiafdelingen.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Fysio- og Ergoterapiafdelingen

##### **Aalborg**

Tlf. 97 66 42 10

##### **Thisted**

Tlf. 97 65 00 60

##### **Farsø**

Tlf. 97 65 31 30