



Anlæggelse af blærekateter

Du skal have anlagt et kateter (en tynd gummislange) i din blære.

du læse mere på patienthåndbogen.dk. Søg på: 'røntgenstråler og risici'.

SÅDAN FOREGÅR INDGREBET

Indgrebet foregår ved hjælp af ultralydsskanning og røntgengennemlysning.

Indgrebet sker i lokalbedøvelse.

Lægen laver et mindre snit i huden, som kateteret anlægges igennem. Herefter sprøjtes kontrastvæske ind i kateteret for at sikre, at det ligger rigtigt.

Hvis du skal have kateteret permanent, kan hullet (fra huden til blæren) udvides lidt, så der kan indlægges et tykkere kateter, et såkaldt ballonkateter

Hvis du har et almindeligt blærekateter i forvejen, fjerner vi dette, når det nye kateter er anlagt.

Indgrebet varer cirka 1 time.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til indgrebet, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Afdeling U9

Tlf. 97 66 33 20

Vi træffes:

Mandag – fredag 8.30 – 15.00

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Tag din sædvanlige medicin

Får du medicin, så tag den samme dosis, som du plejer, inden du møder hos os, **medmindre** du har fået andet at vide.

Ring til os, hvis du er gravid

Hvis du er – eller kan være – gravid, skal du kontakte os inden aftalen, da det kan have indflydelse på gennemførelsen af indgrebet.

MULIGE RISICI

Der er risici forbundet med røntgenstråling. Fordelene ved at bruge røntgenstråler overstiger dog i langt de fleste tilfælde den risiko, der er ved at få foretaget en røntgenundersøgelse. Vil du vide mere om risici, kan