



# Behandling af kvalme med Metoclopramid

Du skal have medicinen Metoclopramid for at forebygge kvalme og opkastning i forbindelse med din kemoterapi eller strålebehandling.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Metoclopramid blokerer frigivelsen af de stoffer i kroppen, der giver kvalme og opkastning. Desuden virker Metoclopramid stimulerende på tarmfunktionen, så mavesækken tømmes hurtigere.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

### Behandling derhjemme

Metoclopramid findes som tabletter. Tabletterne skal synkes med vand og virker efter ½ time.

Du skal tage den dosis Metoclopramid, som vi har aftalt.

Du kan afhjælpe kvalme i forbindelse med måltider ved at tage Metoclopramid ½ time før måltidet.

Tabletterne skal opbevares ved stuetemperatur.

### Behandling på hospitalet

Hvis du er indlagt på hospitalet, kan du eventuelt få Metoclopramid som væske i et drop.

## BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- Døsighed
- Indre uro
- Besvær med vandladning

- Ufrivillige bevægelser.  
Du kan opleve, at din krop gør ufrivillige bevægelser. De forsvinder igen, når du ikke længere tager medicinen.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00