

Behandling af nedsat pumpefunktion med ACE-hæmmere

Du skal i behandling med medicin, der hører til gruppen ACE-hæmmere. ACE-hæmmere bruges til at behandle nedsat pumpefunktion i hjertet.

Du bliver tilbudt såkaldt optitrering af dosis i vores ambulatorium. Optitrering vil sige, at du løbende får tilpasset medicinen, så den virker bedst muligt for dig ud fra en fysisk kontrol og individuel vurdering.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Hvis hjertet af en eller anden grund er belastet, vil forskellige mekanismer i hjertet automatisk træde til for at kompensere for belastningen. Det er skadeligt for hjertet på længere sigt. Disse mekanismer kan bremses medicinsk med ACE-hæmmere.

Effekten af behandlingen er afhængig af dosis. Undersøgelser har vist, at den bedste effekt opnås ved 10 mg per dag. Vi søger derfor at nå denne mængde som slutdosis.

Behandlingen er også god på længere sigt, da den forebygger, at du får tilbagefald.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

En sygeplejerske følger og regulerer din behandling. Som regel er det en læge, der igangsætter behandlingen, og en sygeplejerske, der følger op på den.

Din dosis bliver øget med 1-3 ugers mellemrum, indtil slutdosis er nået, forudsat der ikke opstår problemer.

Hver gang du kommer til kontrol, bliver du vejlet og får målt blodtryk og puls. Vi snakker også om, hvordan du har haft det siden sidst.

Cirka hver 14. dag får du taget en blodprøve for at kontrollere, hvordan dine nyrer fungerer.

Når du er på fuld dosis, vil den læge, der satte behandlingen i gang, igen overtage kontrollen af din behandling.

BIVIRKNINGER

Behandlingen kan medføre tør hoste og svimmelhed.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Medbring din medicinseddel

Du skal ikke forberede dig, når du skal til kontrol, men det er vigtigt, at du har din medicinseddel med hver gang.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

**Hjertemedicinsk Ambulatorium
Thisted**

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 9.00 samt
13.00 – 14.30