

# Behandling med Immunglobulin (IVIg)

Immunglobulin er antistoffer, der udgør en del af kroppens immunforsvar mod celler, der er fremmede for kroppen, fx bakterier. Immunglobulin stammer fra blod, som er tappet fra bloddonorer.

Det immunglobulin, vi bruger, kommer udelukkende fra danske donorer. For at forhindre, at der overføres infektioner til dig, er blodet sikret ved:

- omhyggelig udvælgelse af bloddonorer for at sikre, at mulige infektionsbærere udelukkes
- omfattende testning af hver bloddonation for virus og infektioner
- behandling af immunglobulin med virusdræbende midler.

For at sikre dig bedst muligt som patient, vil vi ligeledes teste dig for HIV og leverbetændelse type B og C før og efter et behandlingsforløb med immunglobulin.

## SÅDAN VIRKER IMMUNGLOBULIN

Immunglobulin supplerer dine egne antistoffer, så de kan reagere normalt over for en - i dit tilfælde - graviditet. Immunglobulin vil hjælpe til med at støtte og balancere dit eget immunsystem, så det reagerer normalt over for kroppens egne celler, herunder fx foster- og moderkageceller.

Da immunglobulin stammer fra blod fra mennesker, fungerer de præcist, som om de var dine egne antistoffer. Immunglobulin kan også reducere symptomerne i visse betændelsestilstande. Disse virkninger forstås dog stadig ikke fuldt ud.

Immunglobulin lagres i din krop. Der går cirka 6 uger fra du får immunglobulin, og indtil mængden i din krop er halveret.

## SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

### Du får behandling via en blodåre

Immunglobulinpræparater gives som udgangspunkt som infusion i en blodåre (intravenøs infusion). Du får anlagt et tyndt kateter i en blodåre enten i hånden eller i armen. Vores læger bestemmer, hvor meget immunglobulin du skal have. Antallet af infusioner afhænger af dine graviditets- og abortforløb og dine blodprøvesvar.

### Så lang tid varer den enkelte behandling

Du skal de første par gange regne med at være i afsnittet i 3-4 timer. Når vi kan se, at du tåler behandlingen godt, øger vi den hastighed, du får antistofferne med.

### Vi følger din graviditet med blodprøver og scanninger

Ved hver behandling frem til, at vi kan skanne dig omkring 6. graviditetsuge, vil vi måle dit graviditetshormon (hCG) i en blodprøve. Fra 6. graviditetsuge vil vi skanne dig forud for infusionen for at kontrollere, at dit foster udvikler sig, som det skal.

### Så ofte og så længe skal du have behandling

Behandlingerne igangsættes altid om formiddagen på hverdage. Planen er individuel. Nogle af vores patienter får allerede infusioner, inden de er blevet gravide. Andre starter i 4. graviditetsuge efter 2 blodprøver, hvor hCG er steget tilstrækkeligt. Som udgangspunkt stopper behandlingerne før 14. graviditetsuge, medmindre andet er aftalt. De første 3 behandlinger gives med cirka en uges mellemrum. Sidenhen vil behandlingerne finde sted hver anden uge.

Tidspunkterne aftaler vi fra gang til gang. Du er velkommen til at medbringe læsestof, mad, drikkevarer og en computer. Der er gratis internetadgang, men vi kan ikke forsyne din computer med strøm. Du har også – efter aftale med sygeplejersken – mulighed for at gå en tur på hospitalet.



## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Immunglobulin tåler ikke sollys. Derfor beder vi dig om at opholde dig indendørs under behandlingen.

## MULIGE BIVIRKNINGER

Følgende bivirkninger kan forekomme:

- Hovedpine
- Kuldegysninger
- Feber
- Opkastning
- Milde overfølsomhedsreaktioner, fx hududslæt og kløe
- Kvalme
- Ledsmerter
- Lavt blodtryk
- Moderat smerte i lænden.

For at nedsætte risikoen for bivirkninger vil vi i begyndelsen lade infusionen løbe langsomt. Hvis du tåler behandlingen godt, vil vi gradvist lade infusionen løbe hurtigere. Vi opfordrer dig til at drikke rigeligt med vand eller saft under infusionen og i dagene efter for at nedbringe risikoen for bivirkninger.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

**Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet**

Tlf. 97 66 30 93

Vi træffes hele døgnet