

Behandling med nitroglycerin

Nitroglycerin er et lægemiddel mod hjertekrampe. Lægemidlet bruges både ved hjertekrampeanfald (angina pectoris) og som forebyggende behandling, hvis du står over for en anstrengelse, der kan medføre hjertekrampe.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Nitroglycerin udvider hjertets blodkar. Dermed fordeles blodet bedre i hjertets kransårer, og blodtrykket falder lidt. Dermed mindskes hjertets arbejde og behovet for ilt.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have nitroglycerin som spray eller i såkaldte resoribletter.

Når du får nitroglycerin i tabletform, skal du placere tabletten under tungen, hvor den hurtigt smelter. Virkningen udebliver, hvis du synker tabletten.

Hvis du får nitroglycerin via spray, skal du tage 1-2 pust under tungen.

Medicinen virker i løbet af ½-2, højst 5 minutter, og den virker i 10-30 minutter. Hvis virkningen udebliver efter den første dosis, kan du roligt tage flere doser, men med 2-5 minutters mellemrum. Gentager du behandlingen, bør du sidde ned, da du kan blive svimmel.

Hvis dine anfald bliver hyppigere, eller hvis du ikke har effekt af behandlingen selv efter at have indtaget 5-6 doser, bør du kontakte din egen læge eller Lægevagten.

MULIGE BIVIRKNINGER

Der kan være følgende bivirkninger ved behandlingen:

- Forbigående hovedpine
- Rødme og varmfølelse i ansigtet
- Svimmelhed på grund af det nedsatte blodtryk.

Alle bivirkninger er forbigående, og der er ingen bivirkninger på lang sigt.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Opbevar medicinen i original emballage og medbring den altid

Det er vigtigt, at du opbevarer nitroglycerin i den originale emballage. Husk altid at skrue låget tæt til.

Du kan opbevare nitroglycerin i en bukselomme eller i en håndtaske, dog altid i original emballage.

Du bør altid have nitroglycerin med dig.

Tjek udløbsdatoen

Nitroglycerin er holdbar indtil den udløbsdato, der står på glasset. Hvis medicinen ikke virker, skal du være opmærksom på, om tabletterne kan være for gamle.

Brug aldrig nitroglycerin samtidig med fx Viagra®

Generelt tåles nitroglycerin fint sammen med andre lægemidler.

Nitroglycerin må dog ikke bruges samtidig med medicin, der bruges ved manglende evne til at opnå eller vedligeholde erektion (fx Viagra® og Cialis®). Det skyldes risiko for svært blodtryksfald. Har du taget Viagra® eller lignende lægemidler, må du ikke tage nitroglycerin 24 timer efter.

Fortsættes...



KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Kardiologisk Afdeling

Sengeafsnit S2
Tlf. 97 66 45 30