

Blæreskylning med Calmette-vaccine

Du er henvist til blæreskylning med Calmette-vaccine. Calmette-vaccinen kaldes også BCG. Behandlingen udføres ved, at vaccinen i væskeform lægges ind i blæren, og behandlingen gentages ugentligt i 6 uger.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Behandlingen fungerer som en vaccination, da BCG er levende, svækkede tuberkelbakterier. Bakterierne stimulerer kroppens eget celleforsvar i blærevæggen, når blæren bliver skyllet med dem. En blæreskylning med Calmette-vaccine mindsker og forebygger altså eventuelle nye forandringer i blæren.

6 behandlinger

Du skal have behandlingen én gang om ugen i 6 uger. Behandlingen foregår ambulantly. Den første behandling får du cirka 3 uger efter, du har fået taget vævsprøver fra blæren ved en kikkertundersøgelse eller du har fået fjernet en svulst fra blæren.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at vaske dig fornedet om morgenen inden blæreskylningen. Er du mand, er det vigtigt, at du trækker for huden tilbage og skyller området grundigt.

Medbring en urinprøve

Inden behandlingen undersøger vi din urin for bakterier. Derfor skal du tage en morgenuurinprøve med. Du kan købe et glas til urinprøven på apoteket. Det er vigtigt, at du opbevarer urinprøven køligt, fx i en plastikpose med isterninger, også under transporten til sygehuset. Hvis du har blærebetændelse med symptomer, er vi nødt til at udsætte behandlingen.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du får vaccine via et kateter

BCG-vaccinen består af ½ dl væske, som lægges op i blæren ved hjælp af et kateter, der bliver ført op gennem urinrøret. For at få bedst mulig effekt af behandlingen skal væsken helst blive i blæren i 2 timer. Når de 2 timer er gået, lader du vandet, og blæren bliver tømt for væsken.

Bevæg dig under behandlingen

Mens du har væsken i blæren, skal du helst være i aktivitet. Det er for at sikre, at hele blærevæggen bliver behandlet.

BIVIRKNINGER

Luft i urinen

Du kan opleve, at der kan være luft i urinen i forbindelse med den første vandladning efter skylningen. Det skyldes, at der kan være kommet luft ind i blæren, da vi lagde væsken op.

Almindelige bivirkninger

I de første døgn efter behandlingen kan du opleve bivirkninger som:

- svie ved vandladning
- blodig urin
- hyppig vandladning
- influenzalignende symptomer
- kvalme
- almindelig utilpashed

Hvis du får udtalte gener

Får du mere udtalte gener i længere tid som fx temperaturstigning over 38,5 grader, ledsmerter, opkastning eller tegn på allergiske reaktioner, skal du kontakte din egen læge. Vi vil, når du kommer til behandlingen, drøfte, hvordan du har det, og hvor generet du er af de bivirkninger, som følger med BCG-skylningerne.



VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Brug kondom under behandlingen

Så længe du får blæreskylningerne, skal I bruge kondom under samleje for ikke at overføre BCG-væske til din partner.

Sid ned på toilettet

Vandladning bør foregå siddende for at hindre sprøjt uden for toilettet.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Hvis du har spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 30 08
Mandag – fredag 8.30 – 12.00

Urologisk Sengeafsnit 10

Tlf. 97 66 33 13
Hele døgnet