



Blæreskylning med Calmette-vaccine

Du skal i behandling med Calmette-vaccine på grund af forandringer eller svulster i slimhinden i din blære. Behandlingen med Calmette foregår som blæreskylninger.

Sådan virker vaccinen

Calmette er en bacille, som er med til at forhindre, at der gendannes slimhindeforandringer i blæren. Behandlingen virker ved at stimulere kroppens eget celleforsvar i blærevæggen. På den måde hjælper blæreskylningen med at mindske og forebygge eventuelt nye svulster i blæren.

Sådan foregår blæreskylningen

Calmette er et pulver, som opløses i 50 ml saltvand. Vi lægger opløsningen op i din blære ved hjælp af et kateter.

Væsken skal blive i blæren i 2 timer for at have bedst mulig effekt. Du skal helst være i aktivitet imens, så væsken bevæger sig rundt i blæren og behandler hele blærevæggen. Når de 2 timer er gået, lader du vandet og tømmer på den måde blæren for Calmette-væsken.

Undgå at drikke før og under behandlingen

Vi anbefaler, at du ikke drikker noget 2 timer før behandlingen og i de 2 timer, behandlingen varer. Så undgår du at skulle lade vandet, imens behandlingen foregår.

Undersøgelse for blærebetændelse

Lige inden hver behandling beder vi dig om at lade vandet. Det skyldes, at din blære skal være helt tømt, før vi lægger Calmette-væsken op.

Hvis du har blærebetændelse, er vi nødt til at udsætte din behandling.

Du skal have 6 behandlinger

Du skal have skyllet blæren 1 gang om ugen i 6 uger. Den første behandling får du cirka 6 uger efter, at du har fået lavet en kikkertundersøgelse af blæren eller fået fjernet en svulst fra blæren.

Resultatet af behandlingen

Cirka 2 måneder efter din sidste blæreskylning skal du have foretaget en kikkertundersøgelse af blæren, også kaldet en cystoskopi. Undersøgelsen viser, hvordan behandlingen med Calmette har virket.



Du får tid til undersøgelsen og mere information om, hvordan den foregår, når du får din sidste blæreskylning.

Lægen tager stilling til, om det senere kan blive nødvendigt med flere skylninger med nogle måneders mellemrum.

Hvis der er effekt af Calmette-behandlingen, tilbyder vi dig vedligeholdelsesbehandling i intervaller af 3 skylninger med en uges mellemrum hver 4. måned og senere hvert halve år - i alt i en 3-årig periode. Vi følger kontinuerligt op på skyllebehandlingerne med kikkertundersøgelser af blæren.

Bivirkninger

I de første døgn efter blæreskylningen kan du opleve følgende gener:

- Kvalme
- Blærebetændelse
- Hyppig vandladningstrang
- Smerter ved vandladning
- Feber op til 38,5 grader
- Influenzalignende symptomer
- Almindelig utilpashed.

Får du sværere gener i længere tid, for eksempel feber over 38,5 grader, ledsmerter, opkastning eller tegn på allergiske reaktioner, skal du kontakte os. Uden for vores åbningstid skal du kontakte lægevagten.

Normalt er bivirkningerne ikke så slemme, og du kan sagtens passe dit arbejde og dagligliv. Hvis du er meget generet, skal du kontakte Urologisk Ambulatorium.

Vær opmærksom på

Brug prævention

Så længe du er i behandling og får blæreskylninger, skal I bruge kondom under samleje, så du ikke smitter din partner med Calmette-bakterier. Kvinder i den fødedygtige alder bør også bruge anden form for prævention.

Sid ned på toilettet

Du bør sidde ned og lade vandet for at hindre sprøjt uden for toilettet.

Skriv dagbog

For at kunne vurdere dine bivirkninger, vil vi gerne have dig til at føre dagbog over de bivirkninger, du oplever i de 6 uger, behandlingen varer. Ved første behandling får du udleveret et skema til formålet. Du skal vurdere dine symptomer som ændringer i forhold



til din tilstand, før du begyndte behandlingerne. Hvis du føler, du har feber, skal du måle din temperatur og anføre den i skemaet.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Urologisk Ambulatorium

Sygeplejerske

Tlf. 97 65 10 45

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 13.00 – 14.00

Sekretær

Tlf. 97 65 10 46

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 9.00 og 10.00 – 12.00