

Ultralydsskanning af blærehalskirtlen med udtagning af vævsprøver

Du skal have foretaget en ultralydsskanning af blærehalskirtlen (prostata).

Baggrunden for skanningen er, at du har fået taget en blodprøve, som viser, at PSA er forhøjet. PSA er et stof, der laves i blærehalskirtlen.

PSA kan være forhøjet af mange grunde, og mange har et for højt niveau af PSA, uden at der er tale om ondartet sygdom.

Ved ultralydsskanningen vil vi vurdere din prostata og tage vævsprøver, som vi sender til nærmere undersøgelse.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Først taler du med sygeplejerske, som informerer dig om undersøgelsen og fortæller dig om forløbet.

Du får udleveret antibiotika, som forebygger infektion. Infektion kan nemt kan forekomme, fordi vævsprøverne tages gennem tarmen.

Du får også udleveret smertestillende medicin, som samtidig forebygger, at vævet omkring blærehalskirtlen hæver.

Det er en læge, der skanner dig og tager vævsprøver. Under undersøgelsen skal du ligge på venstre side med bøjede ben. Lægen fører forsigtigt en ultralydsskanner op i din endetarm. Skanneren er smurt med en gel, der gør den lettere at føre op.

Lægen skanner så blærehalskirtlen og vurderer størrelse og udseende. Derefter udtages vævsprøver igennem skanneren. Det mærkes som kortvarige stik. Lægen tager som regel 12 prøver. Hvis der skal tages flere prøver, kan lægen anlægge en lokalbedøvelse via skanneren.

Selve undersøgelsen varer cirka ½ time.

Du skal blive i afdelingen i cirka 20 minutter efter undersøgelsen, og du må først tage hjem, når du har

ladet vandet. Da vandladningen kan være blodig, skal du lade vandet i et bæger, så en sygeplejerske kan se den, før du forlader afdelingen. Du må gerne drikke rigeligt, mens du venter på at komme hjem.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Medbring en medicinliste

Medbring en liste over din aktuelle medicin.

Kontakt os, hvis du er i blodfortyndende behandling

Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du kontakte os hurtigst muligt, da du skal holde pause med behandlingen og eventuelt have en anden blodfortyndende behandling. Blodfortyndende behandling kan være Magnyl® (Hjertemagny® eller Kodimagnyl®), Marevan, Plavix®, Persantin®, Pradaxa®, saralto og Xarelto®.

Ellers er risikoen for blødning under indgrebet for stor. Vi udleverer eventuel alternativ medicin til dig.

Medbring en urinprøve

Du skal medbringe en morgenurinprøve i et glas fra apoteket. Opbevar prøven på køl, indtil du tager af sted til sygehuset.

NÅR DU KOMMER HJEM

Tag den udleverede smertestillende medicin

Du får udleveret smertestillende medicin, som du skal tage cirka 6 og 12 timer efter undersøgelsen.

Forvent at have blod i afføring og urin

Du kan have blod i afføring og urin i dagene efter undersøgelsen. I ugerne efter kan du ligeledes have blod i din sæd, og nogen oplever smerter ved samleje. Det er helt normalt og går over af sig selv.

Vær opmærksom på infektion

Du skal være opmærksom, hvis du får feber i de første 24 timer efter undersøgelsen. Der kan opstå infektion i det område, hvor du har fået taget



vævsprøverne. Får du høj feber (over 38-39 grader), kulderystelser og/eller kraftig blødning fra tarmen, skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten. Fortæl, at du har fået taget prøver fra din prostata. Det kan være nødvendigt, at du skal indlægges og have mere antibiotika.

Kontakt din læge ved vandladningsproblemer

Hvis du efter vævsprøverne får problemer med at lade vandet, skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Du får en tid med hjem til en samtale i Urologisk Ambulatorium. Til samtalen får du resultatet af vævsprøverne, og vi drøfter det videre forløb. Det er en god idé at have en pårørende med til samtalen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Ambulatorium

Sygeplejerske

Tlf. 97 65 10 45

Mandag – fredag 13.00 – 14.00

Sekretær

Tlf. 97 65 10 46

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 9.00 og
10.00 – 12.00

Fakta om PSA

PSA står for:

Prostata

Specifikt

Antigen

PSA er et stof, der laves i blærehalskirtlen.

Blærehalskirtlen ligger lige neden for blæren. Blærehalskirtlen laver langt den største del af sæden, og det er PSA's opgave at holde sæden flydende.

Blærehalskirtlens celler lækker normalt en lille smule PSA til blodet, og det er i blodet, at vi kan måle PSA-værdien.

Normalværdien på PSA ligger mellem 0 og 4,0 µg. Hvis den har en højere værdi end 4,0 µg, kan det skyldes følgende forhold:

1. **En stor blærehalskirtel.** En stor blærehalskirtel producerer mere PSA. Dermed lækkes mere PSA til blodet.
2. **Betændelse i eller omkring blærehalskirtlen.** Hvis der er betændelse i eller omkring blærehalskirtlen, kan man sommetider finde meget høje værdier af PSA, uden at det betyder noget. Når betændelsen bliver slået ned, falder PSA-værdien spontant.
3. **Kræftsygdom.** Hvis der er kræftsygdom i blærehalskirtlen, ses højere værdier. Kræftceller er mere utætte end normale celler.