

Kikkertundersøgelse af mavesækken

Du skal have lavet en kikkertundersøgelse af dit spiserør, din mavesæk og din tolvfingertarm – også kaldet en gastroskopi. Undersøgelsen er nødvendig for at se, om der er forandringer i området, der kan forklare dine symptomer.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Inden undersøgelsen taler du med lægen, og har mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.

Undersøgelsen foregår gennem spiserøret ved, at lægen fører et langt rør ind i din mund, ned i dit spiserør til maven og ud i tolvfingertarmen.

Under hele undersøgelsen ligger du på et leje på venstre side. Mens lægen fører røret ind i din mund beder vi dig lave almindelige synkebevægelser.

Undersøgelsen er smertefri, men det kan føles ubehageligt, når røret føres ned igennem dit svælg. Du vil komme til at bøvse og få opkastfølelse. For at beskytte kikkerten og dine tænder, får du en plastikbidering i munden.

For enden af røret sidder et kamera, som gør det muligt for os at se indersiden af dit spiserør, din mavesæk og din tolvfingertarm. Vi kan også se, om der er sår, udposninger eller svulster i området.

Hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt, tager vi vævsprøver (biopsier) fra slimhinden til yderligere undersøgelse.

Undersøgelsen varer cirka 5-10 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Hold pause med medicin mod halsbrand

Hvis du får medicin for halsbrand eller sure opstød, skal du holde pause med denne medicin fra 1 uge

inden undersøgelsen. Få reguleret eventuel blodfortyndende medicin

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin (Marevan®), må INR må højest være 3,0 på dagen for undersøgelsen.

Du bedes kontakte os for at aftale tidspunkt for blodprøve på undersøgelsesdagen.

Mød fastende til undersøgelsen

Du skal faste inden undersøgelsen, så din mavesæk er helt tom. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise fra 6 timer inden undersøgelsen.
- Du må heller ikke drikke mælkeprodukter eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.
- Du må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før. Det kan fx være vand, saftvand eller te og kaffe uden mælk.

Tag din morgenmedicin

Tag din sædvanlige morgenmedicin med lidt vand om morgenen inden undersøgelsen.

Oplys os om eventuelle tandproblemer

På grund af bideringen i munden er det vigtigt, at du fortæller os om eventuelle tandproblemer, inden vi påbegynder undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Forvent ømhed i halsen

Du kan være øm i halsen og svælg i op til 1 døgn efter undersøgelsen. Du kan også have luft i maven og eventuelt en smule diarré.

Få svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen, inden du tager hjem. Har lægen taget vævsprøver, vil der gå cirka 2-3 uger, inden du modtager svar per brev eller i din e-Boks.



MULIGE KOMPLIKATIONER

En gastroskopi er en meget sikker undersøgelse, hvor der kun i sjældne tilfælde opstår komplikationer. Det kan dreje sig om blødning eller hul på de organer, vi undersøger.

I sjældne tilfælde kan der ske skader på tænderne, når røret bliver ført ind.

Kontakt en læge, hvis der opstår komplikationer

Hvis du i det første døgn efter undersøgelsen oplever vedvarende mavesmerter, kraftig blødning, får feber eller bliver utilpas, skal du kontakte din egen læge eller vagtlægen på tlf. 70 15 03 00.

INFORMATION TIL BLODDONORER

Hvis du har fået taget en vævsprøve, må du ikke donere blod i 4 måneder efter undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vil du vide mere om kikkertundersøgelse af spiserør og mavesæk (gastroskopi), kan du eventuelt læse mere på patienthaendbogen.dk. Søg på: "gastroskopi".



Kontakt

Visitationssekretariatet, Thisted

Ved spørgsmål om din tid kan du ringe på tlf. 97 65 06 46
Vi træffes bedst: mandag – fredag,
kl. 7.30 - 9.00 og 13.00 – 14.00

Sygeplejersken

Ved spørgsmål om undersøgelsen kan du ringe direkte til sygeplejersken på tlf. 97 65 06 19, kl. 13.00 – 14.30