



# Moderkageprøve og fostervandsprøve

Hvis du skal have taget en moderkageprøve eller en fostervandsprøve, bruger vi prøverne til at undersøge, om fosteret har kromosomsygdomme og visse arvelige sygdomme.

Vi kan tage moderkageprøven fra 11. graviditetsuge. Vi kan tidligst tage fostervandsprøven fra 16. graviditetsuge. Det er det samme, vi undersøger i de 2 prøver. Om det er den ene eller anden prøve, du skal have foretaget, vil du blive orienteret om.

## SÅDAN FOREGÅR PRØVETAGNINGEN

Prøven bliver taget på Aalborg Universitetshospital af en læge, der assisteres af en sygeplejerske.

Vi tager prøven gennem dit maveskind. Først bliver du ultralydsskannet, så vi kan måle fostrets størrelse og finde ud af, hvor vi skal tage prøven. Herefter vasker vi din hud med en desinficerende væske.

Vi tager selve prøven med en tynd kanyle, og du bliver ultralydsskannet, mens vi tager prøven. Prøvetagningen tager kun et par minutter. Det er forskelligt fra kvinde til kvinde, hvordan det føles at få taget prøven, men de fleste mærker kun et mindre ubehag. De fleste siger, at det ikke er væsentligt anderledes end at få taget en blodprøve i armen.

Du er velkommen til at have 1 voksen ledsager med ind til prøvetagningen, hvor I også vil have mulighed for at stille spørgsmål.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Planlæg at holde fri efter prøven

Du bør planlægge, at du kan holde fri resten af dagen efter prøven. Derudover er der ingen forberedelse til prøverne.

## EFTER PRØVETAGNINGEN

### Tag den med ro resten af dagen

Når du har fået taget prøven, anbefaler vi, at du tager den med ro resten af dagen. Der vil være en abortrisiko ved en moderkageprøve eller en fostervandsprøve på cirka ½-1 %.

### Forvent at føle ubehag

Det er normalt at føle ubehag i timerne efter prøvetagningen. Du kan fx få menstruationslignende smerter og tyngdefornemmelse i underlivet. Du kan eventuelt tage smertestillende medicin (paracetamol) i de anbefalede doser. Smerterne fortager sig som regel efter 1 døgn.

### Kontakt os ved blødning, vedvarende smerter, eller hvis fostervandet siver

Hvis du bløder, fostervandet siver, eller hvis du får vedvarende smerter, skal du kontakte os inden for normal åbningstid. Ved akut behov uden for normal åbningstid skal du kontakte Lægevagten.

### Du får svar på undersøgelsen af prøven

Afhængig af hvilken type undersøgelse du får lavet, varierer svartiden fra 2-3 dage til cirka 3 uger. Du vil få besked på, hvor lang svartid du skal regne med. Vi ringer til dig, så snart vi har svaret.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

...fortsættes



### Kontakt

**Afsnit for Graviditet, Fødsel og Barsel,  
Thisted**

Tlf. 97 65 00 80

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 9.00 – 11.00 og  
13.00 – 14.00

**Ambulatorium for Graviditet og Ultra-  
lyd, Aalborg**

Tlf. 97 66 31 30

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 10.00 – 12.00