

Undersøgelse efter fund af graviditet uden graviditetshule i livmoderen

Du har en positiv graviditetsprøve, men resultatet af en ultralydsundersøgelse gør det nødvendigt at undersøge dig nærmere.

Ved ultralydsundersøgelsen har vi ikke fundet en graviditetshule i din livmoder. Denne tilstand kaldes også for abortus imminens, og der er 3 mulige årsager til, at graviditetshulen ikke er der:

- **Normal graviditet**

Du kan have en normal graviditet i livmoderen, men du har haft ægløsning senere, end man skulle tro, efter din sidste menstruation. Er dette tilfældet, gælder det bare om at vente, for så vokser fostret og vil vise sig normalt inde i livmoderen.

- **Begyndende abort**

Du har haft en graviditet i livmoderen, men er ved at abortere. Når der ikke er særlig blødning, kan du vente, og der er god chance for, at livmoderen tømmer sig af sig selv.

- **Graviditet uden for livmoderen**

Du har en graviditet, som sidder uden for livmoderen. Graviditeter uden for livmoderen sidder oftest i æggelederen. Mange af disse graviditeter forsvinder af sig selv, men hvis det befrugtede æg vokser, vil æggelederen briste, og der vil komme kraftig blødning ud i bughulen. Denne blødning kan ikke ses, men den giver voldsomme underlivssmerter. Hvis den er kraftig, kan man gå i chok og besvime. Graviditetshuler uden for livmoderen er desværre meget svære at finde med ultralyd, så muligheden kan kun udelukkes, hvis graviditeten ses inde i livmoderen.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

For at skelne de 3 mulige årsager fra hinanden tilbyder vi dig en undersøgelse.

Undersøgelsen forløber over nogle dage, hvor der skal tages nogle blodprøver, som viser mængden af

graviditetshormon (HCG). Svaret på blodprøven er en talværdi. Blodprøven skal tages igen efter nogle dage.

- Hvis værdien er meget lav, er alle 3 tilstande i reglen ufarlige.
- Hvis graviditeten er normal, fordobles værdien af HCG i reglen i løbet af 2 døgn.
- Hvis tallet er lavere i næste prøve, er det tegn på, at graviditeten er ved at gå til grunde, uanset om den sidder i eller uden for livmoderen. Er det tilfældet, plejer vi at tage ugentlige blodprøver, indtil der ikke er mere graviditetshormon.
- Hvis tallet stiger, er det tegn på en voksende graviditet. Sker det, foretager vi en ny undersøgelse for at se, om graviditetshulen nu kan ses inden i livmoderen.
- Hvis den første blodprøve viser en høj værdi, vil du måske blive kaldt ind på hospitalet til undersøgelse før den aftalte tid.

Du er velkommen til at ringe til ambulatoriet på tlf. 97 65 00 80 omkring klokken 13.30, når du venter svar på en prøve.

HVIS GRAVIDITETEN SIDDER I ÆGGELEDEREN

Hvis graviditetshormonet stiger, og tallet er så højt, at graviditeten plejer at kunne ses i livmoderen, råder vi dig til at få lavet en kikkertundersøgelse i fuld bedøvelse.

Følg disse forholdsregler, indtil tilstanden er afklaret:

Reager på advarselssignaler

Tilstanden kan udvikle sig livstruende, og det er derfor meget vigtigt, at du reagerer på advarselssignalerne, som er underlivssmerter. Smerterne kommer som regel i perioder og er ofte værst i forbindelse med toiletbesøg.



Hvis du får ondt, og du er bange for, at der er noget galt, skal du ringe direkte til Afsnit for Barsel og Gynækologi på tlf. 97 65 05 65.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Gynækologisk Sekretariat

Tlf. 97 65 00 80

Vi træffes: Mandag – fredag 9.00 – 11.00
og 13.00 – 14.00

Afsnit for Barsel og Gynækologi

Tlf. 97 65 05 65