

Forebyggelse af forstoppelse med Laxoberal®

Du skal i behandling med Laxoberal®. Laxoberal® er et afføringsmiddel, som forebygger forstoppelse, og som oftest anvendes mod forstoppelse som følge af behandling med fx morfin.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Det virksomme stof i Laxoberal® er natruimpicosulfat. Stoffet stimulerer tarmens naturlige bevægelser og påvirker slimhinden i tarmen, så den udskiller mere væske og gør afføringen blødere.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal tage Laxoberal® som dråber. Vi anbefaler, at du begynder med 10-15 dråber i døgnnet. Har denne dosis for kraftig eller ringe virkning, kan du regulere dosis med 2-5 dråber ad gangen, indtil du får den ønskede effekt.

Virningen indtræder som regel efter 10-12 timer.

Dråberne har en neutral smag. Du kan blande dem med vand, saft og lignende.

Du skal opbevare dråberne ved stuetemperatur.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Mavekneb.** Du kan undgå mavekneb ved at dele den daglige dosis ud på flere gange over dagen.
- **Diarré.** Du kan få diarré, hvis du tager for mange dråber.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00