

Funktionsundersøgelse af blæren

For at finde årsagen til dine gener ved vandladning skal du have lavet en funktionsundersøgelse af din blære - en såkaldt urodynamisk undersøgelse. Det er en undersøgelse, hvor vi blandt andet måler, hvor meget din blære kan rumme, hvornår vandladningstrangen opstår, samt hvordan blæren trækker sig sammen under vandladningen.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen starter med, at du lader vandet på almindelig vis. Det er derfor vigtigt, at du møder i ambulatoriet med fyldt blære.

Ved selve undersøgelsen lægger vi 2 katetre. Det ene lægger vi op i blæren, og det andet lægger vi op i endetarmen. Katetret i endetarmen registrerer trykket i bughulen. Vi bruger en lokalbedøvende gel, når vi lægger katetrene.

Efter vi har lagt katetrene, bliver blæren langsomt fyldt med lunkent saltvand. Når du føler vandladningstrang, skal du forsøge at lade vandet med katetret i blæren. Imens måler vi trykket i og uden for blæren. Undersøgelsen gentages, og herefter fjerner vi begge katetre.

Undersøgelsen varer cirka 1 time.

Før du forlader hospitalet, får du en ny tid med hjem til en samtale, hvor du får svar på undersøgelsen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Medbring en urinprøve

Inden undersøgelsen undersøger vi din urin for bakterier. Derfor skal du tage en morgenurinprøve med. Du kan købe et glas til urinprøven på apoteket. Det er vigtigt, at du opbevarer urinprøven køligt, fx i en plastikpose med isterninger, også under transporten til hospitalet.

Mød op med fyldt blære

For at vi kan lave undersøgelsen, skal du møde i ambulatoriet med fyldt blære.

Vær opmærksom på blærebetændelse

Har du i dagene inden undersøgelsen mistanke om blærebetændelse, skal du få din urin undersøgt hos din egen læge. Har du blærebetændelse, skal du i behandling med antibiotika. Ellers kan vi ikke gennemføre undersøgelsen.

Specielt for kvinder

Hvis du har menstruation, kan vi ikke gennemføre undersøgelsen. Du skal derfor ringe og bestille en ny tid.

NÅR DU KOMMER HJEM

Det første døgn efter undersøgelsen kan du have let svie ved vandladning og eventuelt lidt blod i urinen. Det er vigtigt, at du drikker cirka 2 liter væske i løbet af resten af døgnet for at forebygge blærebetændelse.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Inkontinensklinikken

Tlf. 97 66 32 77

Vi træffes bedst

Tirsdag 8.30 – 9.00

Onsdage i ulige uger 8.30 – 9.00

Gynækologisk Ambulatorium

Sekretær (tidsbestilling mm.)

Tlf. 97 66 04 30

Træffes bedst:

Mandag – fredag 9.00 – 11.00 og

13.00 – 14.00

Uro-gynækologisk sygeplejerske

Tlf. 97 66 04 44

Træffes bedst:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

8.00 – 8.30