



CT-skanning af hjertet

Du skal have lavet en CT-skanning af dit hjerte.

CT-skanning er en computerstyret røntgenfotografering. Formålet med skanningen er at undersøge, om du har forsnævring i dit hjertes kranspulsårer.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Før undersøgelsen lægger vi et lille plastikrør (venflon) i en åre i din arm, som vi bruger til at give dig kontraststof igennem. Kontraststoffet kan give varmekøbsfølelse i kroppen, en følelse af at skulle tisse og metalsmag i munden. Disse følelser forsvinder dog hurtigt.

Få minutter før skanningen giver vi dig et pust under tungen med nitroglycerin. Du skal muligvis også have medicin, som dæmper din puls. Denne medicin får du via røret i armen.

Ved undersøgelsen ligger du på et leje, mens skanneren tager billeder fra forskellige vinkler med få millimeters afstand. Undersøgelsen er ikke forbundet med smerte.

Du vil flere gange under skanningen blive bedt om kortvarigt at holde vejret for at undgå forstyrrelser fra din vejtrækning på billederne. Når du holder vejret, er det samtidig vigtigt, at du ligger helt stille, når billederne bliver taget. Det giver de mest skarpe billeder. Skanneren summer, når den tager billederne.

Selve skanningen varer kun få minutter, men hele opholdet i Radiologisk Afdeling varer cirka 30-45 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Få taget blodprøver

Du skal have taget blodprøver før undersøgelsen, og blodprøverne må højst være 14 dage gamle på undersøgelsestidspunktet.

Vi har bestilt blodprøverne, så de ligger i systemet. Du kan få taget dem hos din egen læge eller i Klinisk Biokemisk Afdeling på hospitalet. Du skal selv bestille tid til blodprøvetagningen.

Tag pulsnedsettende tabletter, hvis du har fået besked om det

Det er vigtigt, at din puls er så langsom og regelmæssig som muligt ved undersøgelsen. Det giver det bedste resultat. Det kan derfor i nogle tilfælde være nødvendigt, at du tager tabletter for at nedsætte pulsen. Hvis det gælder for dig, har vi enten udleveret eller tilsendt dig de tabletter, du skal tage, samt noteret det i dit husk-bilag.

Kontakt os ved allergi over for kontraststof

Kontakt os forud for undersøgelsen, hvis du er allergisk over for røntgenkontrast eller tidligere er blevet utilpas i forbindelse med at have fået kontrast.

Ring til os, hvis du er gravid

Hvis du er – eller kan være – gravid, skal du kontakte os inden aftalen, da det kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

Tag ikke Viagra® 24 timer før undersøgelsen

Du må ikke tage Viagra® 24 timer før undersøgelsen, da vi i så fald ikke kan lave den. Har du alligevel taget Viagra®, skal du kontakte os.

Drik rigeligt dagen før undersøgelsen

Dagen før undersøgelsen skal du drikke rigeligt med væske – mindst 2 liter. Det kan fx være vand, saft eller juice. Når din krop får væske nok, kan nyrerne hurtigere udskille kontrastvæske efter undersøgelsen.

Spis, som du plejer

Du skal ikke faste forud for undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Drik rigeligt med vand

Der er ingen forholdsregler efter undersøgelsen, men vi anbefaler dig at drikke rigeligt med vand, da det



hjælper med at udskille kontraststoffet. Stoffet er udskilt efter cirka 24 timer.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Du får svar på undersøgelsen per brev cirka 5 hverdage efter undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Kardiologisk Afdeling
Sengeafsnit S2
Tlf. 97 66 45 30