

Undersøgelse for allergi med priktest

Du skal have lavet en priktest og subkutantest. Med de to priktest kan vi undersøge, om du har allergi over for lokalt bedøvelsesmiddel.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du får sat et stykke tape med en række numre på indersiden af din underarm. Langs tapen sætter vi dråber af de forskellige testekstrakter på huden. Vi gennemprikker herefter hver dråbe med en lille nål, der laver et stik i huden. Herefter tørrer vi den overskydende væske af.

Efter 10-15 minutter kan vi aflæse resultatet. Hvis der kommer kløe og hævelse svarende til et lille myggestik, er testen positiv.

Du kan godt reagere positivt på testen, selvom du aldrig har reageret allergisk over for det pågældende stof. Reaktionen forsvinder hurtigt igen.

Ud over de små prik og kløe, hvis testen er positiv, er der ingen gener forbundet med undersøgelsen.

Du får tilbudt antihistaminer efter testen, så en eventuel reaktion forsvinder hurtigt. Ved negativ priktest skal du videreudredes med subkutan test. Ved subkutan test får du lagt 0,1 ml lokalt bedøvelsesmiddel lige under huden på din underarm. Efter 10-15 minutter kan vi aflæse resultatet. Hvis der kommer kløe eller hævelse, er testen positiv.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Undgå antihistaminer 3 dage før testen

Du må ikke tage antihistamin 3 dage før priktesten, da det kan hæmme reaktionerne.

Undgå creme og cremesæbe på testdagen

På undersøgelsesdagen må du ikke bruge fugtighedscreme eller cremesæbe på underarmen, da det vil hæmme reaktionerne under testen.

Husk at holde pause med B-blokker medicin 72 timer før testen.

Husk at holde pause med ACE-hæmmer medicin 24 timer før testen.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Lungemedicinsk Ambulatorium
Tlf. 97 66 48 00