

Behandling af smerter og hævelse med Ibuprofen

Ibuprofen er et smertestillende lægemiddel, der tilhører gruppen af NSAID (non-steroid anti-inflammatoriske stoffer). Ibuprofen anvendes ved smerter og hævelse i led og muskler.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal tage 400 mg Ibuprofen 3 gange dagligt klokken 8.00, 14.00 og 22.00.

Vi har lavet en recept til dig, og du kan hente medicinen på et hvilket som helst apotek. Skal din recept fornyes, skal du henvende dig til din egen læge.

BIVIRKNINGER

Meget almindelige, ikke alvorlige bivirkninger

Forekommer hos flere end 1 ud af 10:

- Sure opstød/halsbrand
- Diarré.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger

Forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede:

- Ikke alvorlige: Mavesmerter, luft i maven, træthed.
- Alvorlige: Blodigt opkast og/eller afføring på grund af blødning fra mave-tarmkanalen.

Almindelige bivirkninger

Forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede:

- Ikke alvorlige: Kvalme og opkastninger, smerter og ubehag fra maven, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekrampe, mild, forbigående hovedpine, svimmelhed, øresusen, udslæt, væskeophobning i kroppen.

Ikke almindelige bivirkninger

Forekommer hos 1-10 ud af 1.000 behandlede:

- Alvorlige: Åndenød ved anstrengelse, eventuelt også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls,

hævede ben på grund af dårligt hjerte, diarré, slim og blødning fra endetarmen på grund af tyktarmsbetændelse, åndedrætsbesvær på grund af sammentrækning af muskulaturen i bronkierne, ændring i blodets sammensætning, som kan medføre feber og tendens til betændelse, kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse på grund af akut nyresvigt, smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, eventuelt hævelse i ansigt, på hænder og fødder på grund af nyreskade, akut allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud, især ved læber og hals, hallucinationer, leverbetændelse, mundbetændelse med sår, gulsot.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Lægemidler som Ibuprofen kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Ring 1-1-2, hvis du får:

- åndenød, bryst smerter med udstråling til hals eller arme, da det kan skyldes blodprop i hjertet
- lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed, da det kan skyldes blodprop i hjernen eller en hjerneblødning.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Du må ikke tage Ibuprofen, hvis du:

- er allergisk over for Ibuprofen
- tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2-hæmmere mod ledlidelser eller præparater med acetylsalicylsyre)
- tidligere har haft blødning fra mave-tarmkanalen eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende lægemidler (NSAID)
- har aktivt eller tilbagevendende mavesår eller blødning fra mave-tarmkanalen, sår på tolvfingertarmen, blødende tyktarmsbetændelse eller Crohns sygdom



- har tendens til blødninger
- har svært nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion.

Kontakt straks din egen læge eller Lægevagten, hvis du får udslæt, blødning fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde mere information om Ibuprofen på www.indlaegssedler.dk.



Kontakt

Ortopædkirurgisk Afdeling

Aalborg

Tlf. 97 66 23 45

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.30

Farsø

Tlf. 97 65 30 50

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.30

Hjørring

Tlf. 97 64 16 15

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.30

Frederikshavn

Tlf. 97 64 19 26

Vi træffes bedst:

Tirsdag – fredag 8.00 – 14.00

Thisted

Tlf. 97 65 06 55

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.30