



Behandling af migræne med Candesartan

Candesartan anvendes som forebyggende medicin ved migræne.

I sjældne tilfælde kan der forekomme udslæt, forhøjet kalium samt nyrepåvirkning og leverpåvirkning.

SÅDAN VIRKER BEHANDLINGEN

Det er velkendt, at et medikament kan virke på mere end én sygdom. Fx virker Magnyl® smertestillende, samtidig med at det virker forebyggende mod blodpropper.

Candesartan er udviklet til behandling af forhøjet blodtryk, men det har senere vist sig også at have en forebyggende effekt på migræne. Når vi udskriver Candesartan til dig, er det altså ikke for at sænke dit blodtryk, men for at behandle din migræne.

Candesartan virker muligvis forebyggende mod migræne ved at stabilisere blodkarrene, men man kender ikke den nøjagtige virkningsmekanisme.

SÅDAN FUNGERER DIN RECEPT

Recepter er elektroniske, og du kan derfor afhente medicin på alle apoteker i landet. Oftest kan du afhente medicin flere gange på hver recept.

Apoteket udleverer altid det billigste præparat til dig. Derfor kan den ordinerede medicin blive udleveret med andet navn og udseende, men indholdsstoffet og virkningen vil være den samme.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

SÅDAN TAGER DU MEDICINEN

- **Start** med at tage 4 mg 1 gang dagligt i 1 uge. Herefter 8 mg dagligt.
- **Ved manglende effekt efter 1-2 måneder** kan dosis eventuelt øges til 16 mg 1 gang dagligt i 1 uge. Herefter 24 mg 1 gang dagligt, og dernæst 32 mg 1 gang dagligt (maksimal dosis).
- **Ved manglende effekt efter 2 måneder** trappes der ned med 8 mg hver 3.-7. dag, indtil du er helt ude af medicinen.



Kontakt

**Neurologisk Ambulatorium,
Hovedpineambulatoriet**

Tlf. 97 66 22 09

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.00

MULIGE BIVIRKNINGER

Candesartan tolereres generelt godt.

Præparatet nedsætter sjældent et normalt blodtryk. Hos patienter med lavt blodtryk ses der svimmelhed, når man rejser sig.