



# Behandling af forhøjet tryk i hjernen med Acetazolamid

Acetazolamid anvendes til behandling af forhøjet tryk i hjernen. Acetazolamid findes i præparatet Diamox®.

## SÅDAN VIRKER BEHANDLINGEN

Det er velkendt, at et medikament kan virke på mere end én sygdom. Acetazolamid er udviklet til behandling af forhøjet tryk i øjnene, men har også en effekt på forhøjet tryk i hjernen.

Acetazolamid virker ved at nedsætte produktionen af hjernevæske.

## SÅDAN TAGER DU MEDICINEN

Start med at tage 500-750 mg 2-3 gange dagligt – afhængigt af symptomernes sværhedsgrad. Dosis kan i særlige tilfælde øges til 4000 mg dagligt fordelt på 2-3 doser.

## MULIGE BIVIRKNINGER

De hyppigste bivirkninger er træthed, prikken og stikken i hænder og fødder, nedsat appetit, smagsforstyrrelse og svimmelhed. I sjældne tilfælde kan der forekomme nyresten, nedsat nyrefunktion, sukker i urinen, alvorlig hudreaktion, overfølsomhed over for lys, nærsynethed og høretab.

Du bør ikke anvende acetazolamid ved nedsat nyre- og leverfunktion, overfølsomhed over for sulfapræparater, ændringer i salt- og væskebalancen i kroppen og ved Addisons sygdom.

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse under graviditet. Kan om nødvendigt anvendes ved amning.

## SÅDAN FUNGERER DIN RECEPT

Recepter er elektroniske, og du kan derfor afhente medicin på alle apoteker i landet. Ofte kan du afhente medicin flere gange på hver recept. Bed eventuelt apoteket om en udskrift af, hvilke recepter du har, og hvor mange udleveringer der er på dem. Du kan også logge på Sundhed.dk og se dine recepter under "medicinkortet".

Apoteket udleverer altid det billigste præparat til dig. Derfor kan den ordinerede medicin blive udleveret med andet navn og udseende, men indholdsstoffet og virkningen vil være den samme.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

**Neurologisk Ambulatorium,  
Hovedpineambulatoriet**

Tlf. 97 66 22 09

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.00