



Medicinsk provokeret abort

UGE 9 -12

Medicinsk provokeret abort skal foregå under indlæggelse, hvis graviditetens længde er mellem 9 og 12 uger.

Du har i Gynækologisk Ambulatorium talt med en læge eller en sygeplejerske, som har forklaret dig behandlingen og forløbet, og du har fået udleveret følgende medicin:

- Mifegyne – 1 tablet

HUSK at købe disse ting, inden du møder op i Gynækologisk Dagafsnit:

- 2 slags smertestillende medicin, fx Pinex® og Ipren®
- Store natbind.

TIDSPUNKT FOR MEDICIN HJEMME

Mifegyne – tablet 1 stk.: Dato _____ Kl. _____

MØDETID I GYNÆKOLOGISK DAGAFSNIT, 9. SAL

Dato _____ Kl. _____

SÅDAN TAGER DU MEDICINEN HJEMME

Tag Mifegyne-tabletten på det aftalte tidspunkt

Hvis du ikke allerede har gjort det i Gynækologisk Ambulatorium, skal du på det aftalte tidspunkt hjemme tage 1 tablet Mifegyne. Når du har taget tabletten, kan du få blødning og smerter. Får du meget kraftig blødning og smerter, kan du kontakte Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet og aftale eventuel indlæggelse.

Kontakt os, hvis du kaster op inden for 1. time

De fleste har ikke fysisk ubehag efter at have taget Mifegyne. Nogle kan dog få kvalme og opkastning. Kaster du op inden for den første time, skal du ringe til Gynækologisk Ambulatorium. Uden for ambulatoriets åbningstid skal du kontakte Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet. Efter du har kontaktet os, bliver du bedt om at komme ind på hospitalet, hvor du får udleveret en ekstra tablet, som du skal tage.

BEHANDLING I DAGAFSNITTET

1-2 dage efter du har taget Mifegyne tabletten, skal du møde i Gynækologisk Dagafsnit, hvor sidste del af behandlingen foregår. Her får du udleveret 4 stikpiller Cytotec®, som du skal lægge så højt op i skeden som muligt. Samtidig vil du få smertestillende medicin. Du skal være sengeliggende den første time. På den måde forhindrer du, at stikpillerne glider ud.

I løbet af de næste timer vil du sandsynligvis begynde at abortere. Hvis du ikke får tegn på begyndende abort i løbet af 3-4 timer, får du yderligere 2 tabletter Cytotec® og dette kan gentages. Du vil sandsynligvis abortere i løbet af højst 24 timer efter, at du har lagt de første stikpiller op. Når blødningen igen er aftaget, vil du blive skannet, for at se om livmoderen er tom for aborttæv. Hvis den er det, kan du komme hjem.



I enkelte tilfælde er livmoderen ikke tom ved skanningen. Lægen afgør herefter, om du skal have flere stikpiller, eller om du skal have foretaget en udskrabning under bedøvelse.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Du skal ikke faste

Da du ikke skal opereres, skal du ikke faste under aborten. Tværtimod er det vigtigt, at du spiser og drikker normalt.

MULIGE BIVIRKNINGER

Cytotec® og Mifegyne kan give diarré og kvalme. Du kan også opleve, at Mifegyne giver mavesmerter, sammentrækninger og blødning fra livmoderen. Vil du vide mere om den medicin, du behandles med, så besøg siden www.min.medicin.dk.

NÅR DU KOMMER HJEM

Forvent blødning i en periode

Du kan opleve blødning i 10-14 dage. I starten er blødningerne kraftige, men de aftager med tiden. Du kan have pletblødninger frem til næste menstruation, som kommer efter 4-5 uger.

Forholdsregler så længe du bløder

Så længe du bløder, anbefaler vi, at:

- du bruger bind og ikke tamponer
- du undgår svømmehal, karbad og havbad
- din partner anvender kondom ved samleje.

Tag begge slags smertestillende medicin

Du kan have kraftige smerter eller ubehag i forbindelse med aborten. Du kan lindre smerterne med smertestillende medicin fra håndkøb. Du skal tage begge slags smertestillende samtidig:

- Pinex 500 mg. 2 stk. maks. 4 gange dagligt.
- Iprex 200 mg. 2 stk. maks. 4 gange dagligt i højst 3-4 dage.

Kontakt din læge, hvis du bløder efter 30 dage

Hvis du stadig har pletblødning eller blødning efter 30 dage, skal du kontakte din egen læge med henblik på, at få foretaget en ultralydsskanning. Blødning mere end 30 dage efter behandlingen kan være tegn på, at der alligevel er lidt restabortvæv i livmoderen. Det skal måske fjernes ved en udskrabning.

Hvis du tager p-piller

Hvis du tager p-piller efter aborten, skal du tage den første p-pille samme dag, som du har lagt stikpillerne op i skeden. Hvis du venter, er det ikke sikkert, at p-pillerne beskytter mod graviditet i den første måned.

KONTAKT OG MERE VIDEN



Kontakt

Gynækologisk Dagafsnit

Tlf. 97 66 30 88
Vi træffes bedst:
Mandag - torsdag 8.00 – 18.00
Fredag 8.00 – 17.00

Gynækologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 04 30
Vi træffes bedst:
Mandag - fredag 9.00 – 11.00

Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet

Tlf. 97 66 30 93
Kun ved akut henvendelse uden for
Gynækologisk Dagafsnits åbningstid.